



### **3. DERIVACIJE I PRIMJENE**

# 1. Derivacija

- diferencijalni ili infinitezimalni račun - jedan od najvažnijih djelova matematičke analize;
- velika primjena u tehnici;
- derivacija - mjera promjene;
- pojam derivacije - 17 st. (I. Newton - problem određivanja trenutne brzine i G.W. Leibnitz - problem određivanja tangente u bilo kojoj točki krivulje)

**Definicija 1.1** Kažemo da je funkcija :  $A \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$ , derivabilna u točki  $x_0 \in A$  ako postoji limes

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0). \quad ((1))$$

Broj  $f'(x_0)$  nazivamo derivacija funkcije  $f$  u točki  $x_0$ .

Za funkciju  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$  kažemo da je derivabilna na skupu  $B \subseteq A$  ako je derivabilna u svakoj točki tog skupa.

Za funkciju  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ , kažemo da je derivabilna ako je derivabilna na cijelom području definicije  $A$  (tj. ako je  $B = A$ ).

Ako je  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$  derivabilna na skupu  $B \subseteq A$  onda postoji funkcija

$$f'|_B : B \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \rightarrow f'(x),$$

koju nazivamo derivacija funkcije  $f$  na skupu  $B$ .

Ako je  $B = A$  onda govorimo o derivaciji  $f' : A \rightarrow \mathbb{R}$  funkcije  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Derivabilnu funkciju  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$  kojoj je derivacija  $f' : A \longrightarrow \mathbb{R}$  neprekidna funkcija nazivamo neprekidno derivabilna funkcija ili glatka funkcija.

Napomena: Ako je  $x_0 \in A$  izolirana točka ( $\exists \delta > 0$ ,  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (A \setminus \{x_0\}) = \emptyset$ ), onda derivacija  $f'(x_0)$  ne postoji, premda je funkcija definirana u toj točki.

Uvedimo oznake:

$$x - x_0 = \Delta x \quad \text{- prirast nezavisne varijable}$$

$$f(x) - f(x_0) = \Delta f(x) = \Delta y \quad \text{- prirast funkcije } f \text{ u točki } x_0.}$$

Budući  $x \rightarrow x_0$  ako i samo ako  $\Delta x \rightarrow 0$ , onda je

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \text{ili}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} \quad \text{ili} \quad f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

### Primjer

- Ispitajmo derivabilnost funkcije  $f(x) = c$ ,  $c \in \mathbb{R}$ .  
( $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  i nema izoliranih točaka).

Neka je  $x_0 \in \mathbb{R} = D_f$  (bilo koja točka). Tada je

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c - c}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0. \end{aligned}$$

Dakle, za svaki  $x \in \mathbb{R}$  je  $f'(x) = 0$ , pa je derivacija ove funkcije  $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 0$ . Kraće:  $(c)' = 0$ .

- Ispitajmo derivabilnost funkcije  $f(x) = x^2$ .  
( $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  i nema izoliranih točaka).

Neka je  $x_0 \in \mathbb{R} = D_f$  (bilo koja točka). Tada je

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - (x_0)^2}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x (2x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0. \end{aligned}$$

Dakle za svaki  $x \in \mathbb{R}$  je  $f'(x) = 2x$ , pa derivacija ove funkcije  $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2x$ .

Kraće:  $(x^2)' = 2x$ .

- Ispitati derivabilnost funkcije  $f(x) = \sin x$ .  
(sami - knjiga I.Slapničar, str.164.). ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  
 $(\sin x)' = \cos x$ )
- Ispitati derivabilnost funkcije  $f(x) = \cos x$ . ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  
 $(\cos x)' = -\sin x$ )
- Ispitati derivabilnost funkcije  $f(x) = x^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .  
( $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ). (Uputa: koristiti binomni teorem!)

- Ispitati derivabilnost funkcije  $f(x) = a^x$ . (sami - knjiga I.Slapničar, str.172.) ( $\forall x \in \mathbb{R}, (a^x)' = a^x \ln a$ ).

Specijalno:  $(e^x)' = e^x \ln e = e^x$

**Uočimo:** Ako je  $f(x) = x^2$  (funkcija), onda je  $f'(x) = 2x$  (funkcija). Sada je

$$f(1) = 1^2 = 1 \text{ (broj)} \quad \text{i} \quad f'(1) = 2 \cdot 1 = 2 \text{ (broj)}.$$

S druge strane vrijedi

$$(f(1))' = (1)' = 0 \text{ (derivacija konstante),}$$

Dakle,

$$2 = f'(1) \neq (f(1))' = 0,$$

ili općenito

$$f'(x_0) \neq (f(x_0))'.$$

## Geometrijska interpretacija derivacije - problem tangente (Leibnitzov pristup)

Neka je jednadžbom  $y = f(x)$  u ravnini zadan graf funkcije (krivulja), pri čemu je  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  derivabilna funkcija.

Problem: Tražimo algebarsku jednadžbu tangente u nekoj točki dane krivulje.

Neka je  $x, x_0 \in A$  i  $x \neq x_0$ . Točkama  $D(x_0, f(x_0))$  i  $T(x, f(x))$  je određena sekanta (pravac)  $s_T$ . Koeficijent smjera sekante  $s_T$  je

$$k_{s_T} = \operatorname{tg}(\alpha_{s_T}) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Ako točku  $D$  fiksiramo, a točka  $T$  se (po grafu) "približava" (teži) točki  $D$ , tj. ako  $x \rightarrow x_0$ , onda se sekanta  $s_T$  približava tangenti  $t$  u točki  $D$ . Dakle,

$$k_t = \lim_{T \rightarrow D} k_{s_T} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

tj. koeficijent smjera tangente  $t$  na graf funkcije  $f$  u točki  $D(x_0, f(x_0))$  jednak je derivaciji funkcije  $f$  u točki  $x_0$ .

Jednadžba tangente sada glasi

$$t \dots y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$



Točku  $D(x_0, f(x_0))$  nazivamo diralište.

Normala  $n$  u točki  $D(x_0, f(x_0))$  na graf funkcije  $f$  je pravac kroz  $D$  okomit na tangentu  $t$ . Jednadžba normale glasi

$$n \dots y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0), \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

**Primjer** Odredite jednadžbu tangente i normale na parabolu  $y = x^2$  u točki s apscisom  $x_0 = -1$ .

$$f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$$

Sada je

$$f(-1) = (-1)^2 = 1,$$

$$f'(-1) = 2 \cdot (-1) = -2,$$

pa je


$$t \dots y - 1 = -2(x - (-1)),$$

$$n \dots y - 1 = -\frac{1}{-2}(x - (-1)),$$

tj.

$$t \dots y = -2x - 1$$

$$n \dots y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$



$$y = x^2, \quad t \dots y = -2x - 1, \quad n \dots y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

**Teorem 1.2** Ako je funkcija  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$  derivabilna u točki  $x_0 \in A$ , onda je i neprekidna u toj točki.

Dokaz: Budući je funkcija  $f$  derivabilna u točki  $x_0 \in A$ , onda je

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \stackrel{der.}{=} f'(x_0) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Dakle,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , pa je  $f$  neprekidna u  $x_0$ .

Obrat ovog teorema općenito ne vrijedi.

## **Teorem 1.2:**

$$f \text{ deriv. u } x_0 \Rightarrow f \text{ nepr. u } x_0 \quad (P \Rightarrow Q),$$

ili ekvivalentno

$$f \text{ nije nepr. u } x_0 \Rightarrow f \text{ nije deriv. u } x_0 \quad (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

## **Obrat Teorema 1.2 ne vrijedi:**

$$f \text{ nepr. u } x_0 \not\Rightarrow f \text{ deriv. u } x_0 \quad (Q \not\Rightarrow P),$$

ili ekvivalentno

$$f \text{ nije deriv. u } x_0 \not\Rightarrow f \text{ nije nepr. u } x_0 \quad (\neg P \not\Rightarrow \neg Q)$$

Dakle, postoje funkcije koje su neprekidne u nekoj  
točki domene, ali nisu derivabilne u toj točki.

**Primjer** - kasnije.

Pomoću limesa slijeva i zdesna definiramo:

**Definicija 1.3** Kažemo da je  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,

- derivabilna slijeva u točki  $x_0 \in A$  ako postoji limes

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'_{-0}(x_0).$$

Broj  $f'_{-0}(x_0)$  nazivamo derivacija slijeva funkcije  $f$  u točki  $x_0$

- derivabilna zdesna u točki  $x_0 \in A$  ako postoji limes

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'_{+0}(x_0).$$

Broj  $f'_{+0}(x_0)$  nazivamo derivacija zdesna funkcije  $f$  u točki  $x_0$

Dakle, funkcija  $f$  je derivabilna u točki  $x_0 \in A$  ako i samo ako je  $f$  derivabilna slijeva i zdesna u točki  $x_0$  i ako je  $f'_{-0}(x_0) = f'_{+0}(x_0)$ .

Definiramo lijevu i desnu tangentu u točki  $D(x_0, f(x_0))$  na graf funkcije  $f$  :

$$t_l \dots y - f(x_0) = f'_{-0}(x_0)(x - x_0),$$


$$t_d \dots y - f(x_0) = f'_{+0}(x_0)(x - x_0).$$

**Primjer** Ispitajmo derivabilnost funkcije  $f(x) = |x|$  u točki  $x_0 = 0$ . ( $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  i nema izoliranih točaka).

$$\begin{aligned} f'_{-0}(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{-0}} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{-0}} \frac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{-0}} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{-0}} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{-0}} -1 = -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_{+0}(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+0}} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+0}} \frac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+0}} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+0}} \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+0}} 1 = 1. \end{aligned}$$

Dakle,  $f$  je derivabilna i slijeva i zdesna u točki  $x_0 = 0$  ( $\exists f'_{-0}(0)$  i  $\exists f'_{+0}(0)$ ), ali je  $f'_{-0}(0) \neq f'_{+0}(0)$ , pa  $f$  nije derivabilna u  $x_0 = 0$  (ne postoji  $f'(0)$ ).



$$y = |x|$$

Uočimo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0),$$

pa je  $f$  neprekidna u točki  $x_0 = 0$ . Ovo je primjer funkcije za koju ne vrijedi obrat Teorema 1.2 u točki  $x_0 = 0$ .

Lijeva i desna tangenta u točki  $D(0, 0)$  na graf funkcije  $f(x) = |x|$ :

$$t_l \dots y - 0 = (-1) \cdot (x - 0) \implies y = -x,$$

$$t_d \dots y - 0 = 1 \cdot (x - 0) \implies y = x.$$


Uočimo: Restrikcije  $f|_{(-\infty,0)}$  i  $f|_{(0,\infty)}$  su derivabilne funkcije. Naime, vrijedi

$$(f|_{(-\infty,0)})'(x) = (-x)' = -1, \quad \forall x < 0,$$

$$(f|_{(0,\infty)})'(x) = (x)' = 1, \quad \forall x > 0.$$

Dakle,

$$f'(x) = |x|' = \left\{ \begin{array}{ll} -1, & x < 0, \\ \text{ne postoji,} & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{array} \right\} = \text{sgn}(x)$$



$$y = \text{sgn}(x)$$

## 2. Pravila deriviranja

**Teorema 2.1 (pravila deriviranja)** Neka su funkcije  $f, g :: A \longrightarrow \mathbb{R}$ , derivabilne na skupu  $B \subseteq A$ . Tada za svaki  $x \in B$  vrijedi

**i)**  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x);$

**ii)**  $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x);$

**iii)**  $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x);$

**iv)**  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}, \quad g(x) \neq 0.$

Dokaz:

**i)** sami;

**ii)** sami;

**iv)** sami - knjiga I.Slapničar, str.167.



iii) Neka je  $x_0 \in B$  (bilo koja točka). Tada je

$$\begin{aligned}(f \cdot g)'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f \cdot g)(x_0 + \Delta x) - (f \cdot g)(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) \cdot g(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x_0 + \Delta x) \cdot g(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \cdot g(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{f(x_0) \cdot g(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{\Delta x} \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} g(x_0 + \Delta x) + \\ &\quad + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} f(x_0) = \\ &= f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)\end{aligned}$$

iii)' Specijalno:

$$(cf)'(x) = c' \cdot f(x) + c \cdot f'(x) = 0 + c \cdot f'(x) = cf'(x), \quad c \in \mathbb{R}.$$

**Primjer**

$$\begin{aligned} (tgx)' &= \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} = \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}, \quad \cos x \neq 0 \end{aligned}$$

Slično:

$$(ctgx)' = \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \dots = -\frac{1}{\sin^2 x}, \quad \sin x \neq 0$$

**Teorem 2.2 (derivacija kompozicije)** Ako je funkcija  $f$  derivabilna u točki  $x_0 \in D_f$  i funkcija  $g$  derivabilna u točki  $y_0 = f(x_0) \in D_g$ , tada je kompozicija  $h = g \circ f$  derivabilna u točki  $x_0$  i vrijedi

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

**Primjer 1** Treba naći  $h'(x)$ , ako je  $h(x) = \cos(\sin x)$ .  
Imamo

$$h(x) = (g \circ f)(x), \quad f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x$$

Neka je  $x_0 \in \mathbb{R}$  (bilo koja točka) i  $\sin x_0 = y_0$ . Tada je, po Teoremu 1.3,

$$\begin{aligned} h'(x_0) &= \cos y_0 \cdot (-\sin x_0) = \\ &= \cos(\sin x_0) \cdot (-\sin x_0) = -\cos(\sin x_0) \cdot \sin x_0, \end{aligned}$$

tj.

$$(\cos(\sin x))' = -\cos(\sin x) \cdot \sin x.$$

**Primjer 2**

$$(shx)' = \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' \stackrel{T2.1, iii)'}{=} \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})' \stackrel{T1.2, ii)}{=}$$

$$\frac{1}{2} [(e^x)' - (e^{-x})'] \stackrel{T1.2}{=} \frac{1}{2} [e^x - (-1)(e^{-x})]$$

$$= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = chx$$

**Teorem 2.3 (derivacija inverzne funkcije)** Neka je  $f : A \longrightarrow B$  bijekcija, neka je  $f$  derivabilna u točki  $x_0 \in A$  i  $f'(x_0) \neq 0$ . Ako je pripadna inverzna funkcija  $f^{-1} : B \longrightarrow A$  neprekidna u točki  $y_0 = f(x_0) \in B$ , tada je

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

### Primjer 1 Funkcija

$$f(x) = x^2, \quad f : [0, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$$

je bijekcija i  $f$  je derivabilna ( $f'(x) = 2x, \forall x \geq 0$ ).  
Budući je

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}, \quad f^{-1} : [0, \infty) \longrightarrow [0, \infty),$$

onda je za  $x \in [0, \infty)$

$$x^2 = y \iff x = \sqrt{y}.$$

Iz Teorema 1.4 slijedi

$$(\sqrt{y})' = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0,$$

pa je

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

## Primjer 2 Funkcija

$$f(x) = \sin x, \quad f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, 1]$$

je bijekcija i  $f$  je derivabilna ( $f'(x) = \cos x$ ,  $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ).

Budući je

$$f^{-1}(x) = \arcsin x, \quad f^{-1} : [-1, 1] \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

onda je za  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\sin x = y \iff x = \arcsin y$$

Iz Teorema 1.4 slijedi

$$\begin{aligned} (\arcsin y)' &= (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cos x} \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}, \quad y \in (-1, 1), \end{aligned}$$

pa je

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad x \in (-1, 1).$$

Slično:

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad x > 0$$

## Deriviranje implicitno zadane funkcije

Neka je funkcija  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$ , zadana implicitno sa  $F(x, y) = 0$  i neka je  $f$  derivabilna u točki  $x \in A$ . Tražimo  $f'(x)$ . Uvedimo oznake:

$$y = f(x) \quad \text{i} \quad y' = f'(x).$$

Postupak: formalno deriviramo  $F(x, y) = 0$  i koristimo teorem o derivaciji kompozicije.

### **Primjer 1** Jednadžbom

$$2^y - xy + x^2 - 2 = 0$$

je zadana jedna (ili više) funkcija  $f$ . Tražimo  $f'$  i  $f'(0)$ . Uvedimo oznake:

$$y = f(x) \quad \text{i} \quad y' = f'(x).$$

Sada imamo:

$$(2^y - xy + x^2 - 2)' = 0' \implies$$

$$2^y \ln 2 \cdot y' - y - xy' + 2x + 0 = 0 \implies$$

$$y' (2^y \ln 2 - x) = -2x + y \implies$$

$$y' = \frac{-2x + y}{2^y \ln 2 - x}.$$

Ako je  $y_0 = f(0)$ , onda je

$$2^{y_0} - 0 \cdot y_0 + 0^2 - 2 = 0 \implies$$

$$2^{y_0} = 2 \implies y_0 = 1.$$

Ako je  $y'_0 = f'(0)$ , tada je

$$y'_0 = \frac{-2 \cdot 0 + y_0}{2^{y_0} \ln 2 - 0},$$

tj.

$$f'(0) = \frac{-2 \cdot 0 + 1}{2^1 \ln 2 - 0} = \frac{1}{2 \ln 2} = \frac{1}{\ln 4}.$$

**Primjer 2** Treba odrediti jednadžbu tangente na elipsu

$$4(x-1)^2 + 3y^2 = 12 \implies \frac{(x-1)^2}{(\sqrt{3})^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$$

u točki  $T(1, y_0 < 0)$ .

Dakle, treba naći  $y(1)$  i  $y'(1)$ . Imamo:

$$\left(4(x-1)^2 + 3y^2\right)' = (12)' \implies$$

$$8(x-1) + 6yy' = 0 \implies$$

$$y' = -\frac{8(x-1)}{6y}.$$

Imamo

$$4(1-1)^2 + 3y_0^2 = 12 \implies$$

$$y_0^2 = 4 \implies y_0 = \pm 2,$$


Dakle,  $T(1, -2)$ . Sada je

$$y'_0 = -\frac{8(1-1)}{6y_0} = -\frac{8(1-1)}{6 \cdot (-2)} = 0,$$

pa je jednadžba tangente

$$t \dots y - (-2) = 0 \cdot (x - 1) \implies y = -2.$$





**Primjer 3** Treba naći  $f'(x)$ , ako je  $f(x) = x^r$ ,  
 $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Imamo

$$(x^r)' = (e^{r \ln x})' \stackrel{T.2.2}{=} e^{r \ln x} \cdot (r \ln x)' = x^r \cdot r \cdot \frac{1}{x} = r \cdot x^{r-1}$$

Prisjetimo se: Prirodno područje definicije funkcije  
 $f(x) = x^r$  ovisi o realnom broju  $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

- Ako je  $r \in \mathbb{N}$ , onda je  $D_f = \mathbb{R}$ ;
- Ako je  $r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}$ , onda je  $D_f = \mathbb{R}$  ili  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  ili  $D_f = (0, \infty)$  ili  $D_f = [0, \infty)$ ;
- Ako je  $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , onda uzimamo  $D_f = (0, \infty)$  za  $r < 0$  i  $D_f = [0, \infty)$  za  $r > 0$ .

## Logaritamsko deriviranje

Tražimo  $h'(x)$ , ako je  $h(x)$  funkcija oblika

$$h(x) = (f(x))^{g(x)}.$$

Postupak:

- Uvedemo oznaku

$$y = (f(x))^{g(x)};$$

- Logaritmiramo gornji izraz i dobivamo

$$\ln y = g(x) \cdot \ln f(x);$$

- Deriviramo (vodeći računa da je  $\ln y$  složena funkcija - kompozicija)

$$\frac{y'}{y} = g'(x) \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x);$$

- Dobivamo

$$y' = y \left( g'(x) \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \right) \implies$$

$$h'(x) = (f(x))^{g(x)} \cdot \left( g'(x) \cdot \ln f(x) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right)$$

**Primjer 2** Tražimo  $h'(x)$ , ako je  $h(x)$  funkcija oblika

$$h(x) = (\sin x)^{\cos x}.$$

Uvedemo oznaku

$$y = (\sin x)^{\cos x};$$

Logaritmiramo gornji izraz i dobivamo

$$\ln y = \cos x \cdot \ln \sin x;$$

Deriviramo

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \cdot \ln \sin x + \cos x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x;$$

Dobivamo

$$y' = y \cdot \left( -\sin x \cdot \ln \sin x + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right) \implies$$

$$h'(x) = (\sin x)^{\cos x} \cdot \left( -\sin x \cdot \ln \sin x + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right)$$

## Derivacije elementarnih funkcija

U sljedećeoj tablici, sve derivacije elementarnih funkcija definirane su tamo gdje i funkcije. U slučajevima gdje to ne vrijedi dano je područje definicije derivacije.

$$(c)' = 0, \quad (\text{po definiciji})$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (\text{po definiciji})$$

$$(x^r)' = rx^{r-1}, \quad r \in \mathbb{R}, \quad (\text{po Trm 2.2})$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (\text{po definiciji})$$

$$(e^x)' = e^x, \quad (\text{po definiciji})$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\text{po definiciji})$$

$$(\cos x)' = -\sin x, \quad (\text{po definiciji})$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\text{po Trm 2.1})$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, \quad (\text{po Trm 2.1})$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1), \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1), \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\text{arcctg } x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\text{sh } x)' = \text{ch } x, \quad (\text{po Trm 2.1 i Trm 2.2})$$

$$(\text{ch } x)' = \text{sh } x, \quad (\text{po Trm 2.1 i Trm 2.2})$$

$$(\text{th } x)' = \frac{1}{\text{ch}^2 x}, \quad (\text{po Trm 2.1})$$

$$(\text{cth } x)' = -\frac{1}{\text{sh}^2 x}, \quad (\text{po Trm 2.1})$$

$$(\text{arsh } x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\text{arch } x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\text{arth } x)' = \frac{1}{1-x^2}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$

$$(\text{arcth } x)' = \frac{1}{1-x^2}, \quad (\text{po Trm 2.3})$$