

Uvod u matematiku

M. Klaričić Bakula

Listopad, 2007.

1 Uvod

Najstarije poznate matematičke pločice potječu iz 2400. godine prije Krista, no zasigurno se uporaba matematike proteže na cijelu civilizaciju. Tijekom 5000 godina razvila se golema količina postupaka i pojmove poznatih kao matematika i na mnogo načina se ispreplela sa svakidašnjicom. Kakva je priroda matematike? Čime se bavi? Kako se stvara i koristi? Koliko je važna?

Nalaženje odgovora na ta teška pitanja nimalo ne olakšava činjenica da je građa toliko opsežna da ju je nemoguće jednoj osobi spoznati, a kamoli ukratko izložiti. No o matematici možemo razmišljati i na drugi način: matematika je ljudska djelatnost već tisućama godina i svatko je svjesno ili nesvjesno rabi. Uz golemu populaciju koja se pomalo služi matematikom, postoji i malen broj ljudi koji su profesionalni matematičari: oni rade matematiku, njeguju je, podučavaju, stvaraju i koriste se njome u mnoštvu situacija. Matematika je beskrajno složen i tajnovit svijet: istraživanje toga svijeta treba biti strast svakog matematičara.

Naivna definicija matematike glasi: *matematika je znanost o količini i prostoru*. Mogli bismo također dodati da se matematika bavi i simbolizmom koji se odnosi na količinu i prostor. Ova definicija ima povjesnu osnovu i može poslužiti kao početna.

Znanosti o količini i prostoru u svojem su jednostavnijem obliku poznate kao *aritmetika* i *geometrija*. Aritmetika, kakva se poučava u osnovnoj školi, bavi se brojevima raznih vrsta i pravilima za operacije među njima. Također se bavi i svakidašnjim situacijama u kojima koristimo te operacije.

Geometrija se predaje u višim razredima i jednim dijelom se bavi pitanjima prostornih mjerena (udaljenost, površina), no bavi se i onim aspektima prostora koji imaju estetski značaj ili element iznanedženja. Na primjer, ona nam kaže da se tri težišnice bilo kojeg trokuta sijeku u jednoj točki ili da se dijagonale u svakom paralelogramu raspolavljaju. Uči nas da se pod može popločati jednakoststraničnim trokutima ili pravilnim šesterokutima, no ne i pravilnim peterokutima.

Predajemo li geometriju po 2300 godina starom Euklidovom učenju, onda ona ima još jedan važan aspekt, a to je njena prezentacija kao *deduktivne znanosti*. Počevši od izvjesnog broja osnovnih ideja koje uzimamo kao bjelodane same po sebi, i na osnovi nekoliko određenih pravila matematičkog i logičkog manipuliranja, euklidska geometrija gradi sustav sve složenijih dedukcija. Taj deduktivni postupak kojim počevši od hipoteza dolazimo do zaključaka naziva se dokaz. Euklidska geometrija je prvi primjer formaliziranja deduktivnog sustava i postala je model za sve takve sustave. Ona je sjajno područje za vježbanje logičkog razmišljanja i pruža osnovnu poduku u tomu.

Premda su deduktivni aspekti matematike bili jasni drevnim matematičarima, oni nisu bili naglašavani sve do 19. stoljeća kada se mislilo da u geometriji postoji dokaz, dok ga u algebri ili aritmetici nema. S povećanim naglaskom na deduktivne aspekte u svim granama matematike definicija same matematike se mijenja: sredinom dvetnaestoga stoljeća smatra se da je matematika *znanost o doноšењу потребних закључака*. Time nije definiran sadržaj matematike: matematika može biti o bilo čemu, ali samo tako dugo dok se drži predloška pretpostavka-dedukcija-zaključak. No definicija matematike se stalno mijenja i svaka generacija matematičara (ili čak svaki od njih) je formulira prema svom viđenju.

Može se postaviti i pitanje koliko je danas matematike poznato? Smatra se da bi današnje matematičko znanje stalo u otprilike 60000 svezaka prosječne veličine. To- lika količina znanja daleko nadilazi mogućnost usvajanja bilo kojeg pojedinca. Pa ipak je to mala količina usporedimo li je s drugim zbirkama koje bi sakupili za npr. medicinu, fiziku, pravo ili književnost. Još se je donedavno smatralo da dobar student može savladati cjelokupnu matematiku, no danas se to ne bi moglo kazati. Sada se smatra da bi svaki dobro obrazovani matematičar mogao imati osnovna znanja o otprilike 10% raspoloživog matematičkog saznanja. Naime, matematika se često prikazuje kao snažno stablo s korijenjem, deblom, granama i grančicama označenima prema pojedinim disciplinama. To je stablo koje stalno raste! Konstrukcije se povećavaju i popunjavaju. Stvaraju se nove teorije. Uvode se novi objekti. Pronalaze se novi međuodnosi i time se ističu nove cjeline. Traže se nove primjene.

U isto vrijeme, staro i istinito se zadržava (u principu). I tako ispada da je matematika organizam koji stalno raste, a prethodna grana je preuvjet za razumijevanje iduće grane koja je njen izdanak. Takve serijske ovisnosti uglavnom nema u drugim disciplinama.

Koliko bi matematičkih knjiga trebao poznavati budući matematičar? Ako računamo jednu knjigu po kolegiju, pa još udvostručimo rezultat zbog dodatne i neobavezne literature, doći ćemo do broja od oko 60 knjiga. Možemo tako gledati na onih 60000 knjiga kao na ocean znanja čija prosječna dubina iznosi 60 knjiga, iz čega slijedi da postoji oko 1000 uskih područja u matematici, no to je samo jednostavna i gruba procjena. Američko matematičko društvo daje finiju podjelu na otprilike 3000 kategorija matematičkih radova. U većini tih kategorija nova se znanja stvaraju sve većom brzinom: ocean se povećava i u dubinu i u širinu.

No postoji granica žive matematike koju čovječanstvo može odjednom podržavati: kako nastaju nova područja, tako se neka stara moraju zanemarivati. Premda se za svako pojedino područje matematike može očekivati da će postati zasićeno, i premda će se eksponencijalni porast matematičke produkcije prije ili kasnije stabilizirati, teško je predvidjeti kraj čitave matematičke produkcije, osim kao dio kraja općeg stremljenja čovječanstva za sve više znanja i moći.

Uočimo još nešto: postoji piramida znanosti, a osnovicu te piramide čini upravo matematika jer se jedino ona ne mora oslanjati na nijednu drugu znanost!

2 Simboli

Posebni znakovi koji čine dio matematičkog zapisa velik su i živopisan dodatak znakovima prirodnih jezika. Dijete će već u osnovnoj školi naučiti deset znamenki decimalnog sustava $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$, znakove za aritmetičke operacije $+, -, \cdot, :,$ znakove grupiranja $(), \{ \}, []$ i znakove za relacije, poput $=, <, >$. Put u matematiku vodi učenika dalje: do algebre u kojoj se obična slova javljaju u posve neobičnom kontekstu: kao nepoznace ili varijable. Diferencijalni i integralni račun uvodi nove simbole: $d, \int, \infty, \partial, \lim, \sum$ i tako dalje.

Trenutačno se fond posebnih matematičkih simbola koji se stalno koriste sastoji od njih nekoliko stotina, a novi se uvode stalno.

Posebno navodimo slova grčkog alfabetu jer se vrlo često koriste u matematici.

A	α	alfa	I	ι	iota	P	ρ	ro
B	β	beta	K	κ	kapa (\varkappa)	Σ	σ	sigma
Γ	γ	gama	Λ	λ	lambda	T	τ	tau
Δ	δ	delta	M	μ	mi	Υ	υ	ipsilon
E	ϵ	epsilon (ε)	N	ν	ni	Φ	ϕ	fi (φ)
Z	ζ	zeta	Ξ	ξ	ksi	X	χ	hi
H	η	eta	O	\circ	omikron	Ψ	ψ	psi
Θ	θ	theta (ϑ)	Π	π	pi	Ω	ω	omega

3 Apstrakcija

Smatra se da je matematika nastala kad je predodžba o tri jabuke oslobođena od jabuka i postala cijeli broj tri. To je primjer procesa apstrakcije, no kako se pojam apstrakcije u matematici koristi u nekoliko različitih smislova, potrebno ga je pobliže objasniti.

3.1 Apstrakcija kao idealizacija

- ravna crta
- ravnina
- kružnica
- točka

Idealizacije koje su spomenute prešle su iz prostornog iskustva u matematički svijet: Aristotel je opisao taj proces rekavši da matematičar ignorira sve što je osjetilno i ostavlja samo količinu i prostorni kontinuitet. Platonova ideja o svijetu idealiziranih objekata blisko je povezana s matematičkom intuicijom. Svi su matematički objekti apstraktni, a Platonov svijet je dom prave kružnice i pravog kvadrata.

3.2 Apstrakcija kao ekstrakcija

Četiri ptice kljucaju mrvice na dvorištu. Četiri su naranče na stolu. Sama uporaba riječi "četiri" podrazumjeva postojanje procesa apstrakcije u komu se izdvaja zajednička odlika ptica i naranči: za svaku pticu po jedna naranča i za svaku naranču po jedna ptica. Na taj način između ptica i naranči postoji obostrano jednoznačna korespondencija. Tu se nalaze stvarni objekti, no s druge strane imamo apstraktne brojeve koji postoje bez obzira na ptice i naranče.

Danas matematika uglavnom ostavlja po strani ostavlja po strani pitanje kako su nastale takve apstrakcije i usredotočuje se na skupovno-teoretski opis oblikovanja apstrakcije. Apstraktni pojam "četiri" je skup svih skupova koji se mogu staviti u obostrano jednoznačnu korespondenciju s četiri ptice na dvorištu.

4 Generalizacija

Riječi generalizacija i apstrakcija često se rabe kao sinonimi, no riječ generalizacija ima nekoliko specifičnih značenja koja treba rasvijetliti.

Pretpostavimo da je u neko davno doba matematičar X rekao: "Ako je $\triangle ABC$ jednakostraničan trokut, onda je kut uz vrh A jednak kutu uz vrh B ." Zatim je neki drugi matematičar Y primijetio da iako je to točno, nije neophodno da $\triangle ABC$ bude jednakosstraničan. Y bi stoga mogao ustvrditi: U jednakokračnom trokutu su kutovi uz bazu jednakici." Ova druga tvrdnja je generalizacija prve. Prepostavke prve tvrdnje impliciraju prepostavke druge tvrdnje, ali ne i obratno, dok je zaključak isti.

Jedna od prednosti generalizacije je konsolidacija informacija: nekoliko usko povezanih činjenica ekonomično se umotaju u jedan paket. Pogledajmo primjer:

- T1. Ako broj završava s 0, onda je djeljiv s 2.
- T2. Ako broj završava s 2, onda je djeljiv s 2.
- T3. Ako broj završava s 4, onda je djeljiv s 2.
- T4. Ako broj završava s 6, onda je djeljiv s 2.
- T5. Ako broj završava s 8, onda je djeljiv s 2.
- K. Ako broj završava s parnim brojem, onda je djeljiv s 2.

5 Formalizacija

Formalizacija je proces pomoću kojega se matematika prilagođava mehaničkom procesuiranju. Npr. kompjutorski program je primjer formaliziranog teksta. Matematički tekstovi nikada nisu potpuno formalizirani: napisani su nekim jezikom da bi ih ljudi mogli čitati. Ipak, svaki se matematički tekst *može* potpuno formalizirati i to u jednom jedinom formalnom jeziku: jeziku formalne teorije skupova.

Formalne su jezike prvi uveli Peano i Frege krajem 19. stoljeća, a s namjerom da učine matematički dokaz strožim. No ta se svrha nije mogla ispuniti sve dok je dokaz bio namjenjen ljudskom čitatelju. Principia Mathematica Rusella i Whiteheada bila je veličanstven pokušaj da se matematika zaista formalizira, a ostala je zapamćena kao nečitljivo remek-djelo. Ipak, pojavom računala formalni su jezici našli široke primjene i postali jedan od karakterističnih predmeta današnje kulture.

Formalizirani tekst je niz simbola: kada njime manipulira matematičar ili stroj, pretvara se u drugi niz simbola. Manipulacija simbolima može i sama biti predmetom matematičke teorije. Kada na manipuliranje gledamo kao na nešto što izvodi stroj, tada to računarci nazivaju *teorijom automata*, a logičari *teorijom rekurzije*. No kada na manipuliranje gledamo kao na nešto što izvodi matematičar, tada to nazivamo *teorijom dokaza*.

6 Matematički objekti i strukture

Neformalno matematičko izlaganje sastoji se od imenica, glagola, pridjeva i tako dalje. Imenice označavaju matematičke objekte, npr. broj 3, skup prostih brojeva, logaritamsku funkciju. Matematičke strukture su nešto složenije i označavaju matematičke objekte povezane izvjesnim relacijama, no razlika između njih i matematičkih objekata nije strogo određena. Ako se neka matematička struktura dugo koristi i na njoj se gradi iskustvo i intuicija, onda je možemo smatrati matematičkim objektom. Dobar primjer su realni brojevi: često ih smatramo matematičkim objektom, iako je riječ o matematičkoj strukturi.

Važno je shvatiti da je ponekad ono što danas smatramo jednostavnim matematičkim objektom nekad imalo psihološko značenje cijele strukture: na primjer kružnica, pravilni polieder i slično.

Termin "matematički objekt" podrazumijeva da objekt o kojemu se radi na neki način postoji. Mogli bismo pomisliti da je pojam postojanja sasvim jasan, no u stvarnosti su s njim povezane ozbiljne logičke i psihološke poteškoće. Pogledajmo jedan primjer: skup \mathbb{N} ne možemo potpuno doživjeti, no matematičari svakodnevno rade s njim. Skup \mathbb{N} ima svojstvo da ako sadrži neki broj, onda sadrži i njegova sljedbenika. Stoga ne može postojati najveći prirodan broj. Drugo svojstvo koje ima skup \mathbb{N} jest da ga nikad ne možemo iscrpsti izostavljajući njegove članove jednog po jednog. Ta čudesna riznica sa svojstvima koja protuslove svim iskustvima iz naših konačnih života, absolutni je temelj u matematici i smatra se da je u dosegu poimanja djece u osnovnoj školi. No da li je matematička beskonačnost prijevara? Označava li ona nešto što zapravo uopće nije beskonačno? Zašto bismo povjerovali da beskonačno postoji? U formalnoj prezentaciji taj je zahtjev institucionaliziran aksiomatizacijom: uveden je aksiom beskonačnosti koji kaže da induktivan (beskonačan) skup postoji.

7 Oblici matematičkog mišljenja

Mišljenje se u psihologiji definira kao izdvajanje u spoznaji čovjeka određenih strana i svojstava promatranog objekta i njihovo dovođenje u odgovarajuće veze s drugim objektima u cilju stjecanja novih saznanja.

Tri su osnovna oblika mišljenja: *poimanje*, *suđenje* i *zaključivanje*. Kao rezultat tih oblika mišljenja dobivaju se redom *pojmovi*, *jednostavni sudovi* i *složeni sudovi*. *Sud* je svaka suvisla izjavna rečenica koja je istinita ili lažna, ali ne oboje. Pogledajmo primjer za svaki od ovih rezultata oblika razmišljanja.

- 1. Pojam:** Skup svih točaka ravnine jednako udaljenih od jedne čvrste točke te ravnine zove se kružnica.
- 2. Jednostavni sud:** Za svaki prost broj p veći od 3 broj $p^2 - 1$ djeljiv je s 24.
- 3. Složeni sud:** Ako je $a \in A$ i $A \subset B$, onda je $a \in B$.

Oblici mišljenja imaju veliki značaj u matematičkim teorijama. Još od starogrčke matematike većina se matematičkih disciplina nastoji u višoj fazi izgradnje strogog utemeljiti. Takav strogi pristup nekoj matematičkoj disciplini nazivamo *aksiomatskim pristupom*. Najprije kratko objasnimo što to znači aksiomatski zadati neku teoriju. Polazimo od nekog broja pojmova koji se ne definiraju, a nazivamo ih *osnovnim pojmovima*. To znači da smo zadali *jezik teorije*. Zatim se popisuju osnovne tvrdnje o danim osnovnim pojmovima koje se smatraju istinitima. Te tvrdnje, čiju istinitost ne dokazujemo, nazivamo *aksiomima*. Svaki novi pojam uvodimo *definicijom* pomoću osnovnih pojmova (to jest, unutar jezika teorije). Svaku novu *tvrdnju* dokazujemo logičkim zaključivanjem na osnovu *definicija, aksioma i tvrdnji* koje smo već dokazali.

Obično se zahtjeva da izabrani aksiomi zadovoljavaju sljedeća tri principa:

1. **konzistentnost**, tj. iz sustava aksioma ne smije se moći dokazati istodobno neka tvrdnja i njena negacija;
2. **potpunost**, tj. svaka tvrdnja, ili njena negacija, je dokaziva u danom sustavu aksioma;
3. **neovisnost**, tj. niti jedan od aksioma se ne može dobiti kao posljedica ostalih.

Dakle, možemo reći da je neko matematičko područje tvorevina osnovnih pojmoveva, aksioma, izvedenih pojmoveva i dokazanih tvrdnji. No pogledajmo podrobnije na što mislimo pod tim nazivima.

7.1 Matematički pojmovi

Matematički pojam je oblik mišljenja u kojem se odražavaju bitna svojstva objekata koji se proučavaju. *Osnovni pojam* je (u pravilu) jednostavni pojam koji se smatra poznatim, pa se ne definira, tj. ne opisuje se pomoću drugih pojmoveva. Takvi pojmovi su točka, pravac, skup... *Izvedeni pojam* je pojam koji se jasno i precizno definira, što znači da se njegovo značenje opisuje pomoću osnovnih i ranije definiranih pojmoveva. Dakle, *definicija pojma* je nabranjanje nužnih i dovoljnih obilježja toga pojma povezanih logičkom rečenicom ili simboličkim zapisom.

Pogledajmo kako možemo definirati kvadrat.

- D1. Pravokutnik kojemu susjedne stranice imaju jednake duljine naziva se kvadrat.
- D2. Kažemo da je pravokutnik kvadrat ukoliko su mu dijagonale međusobno okomite.
- D3. Kvadrat je romb kojemu je kut između susjednih stranica pravi.

Dakle, neki se pojam može često definirati na više načina, no važno je da sve definicije određuju isti skup objekata, tj. moraju biti međusobno ekvivalentne. Ako odaberemo jednu od tih definicija kao radnu definiciju toga pojma, onda njoj ekvivalentne definicije poprimaju značenje poučaka koji su njene posljedice. To su tzv. *karakterizacije* toga pojma.

Prilikom definiranja nekog pojma treba paziti na sljedeće:

1. Definicija treba biti primjerena pojmu kojeg definira: ne smije biti ni preuska ni preširoka.
2. Definicija treba biti pregledna i sažeta.
3. Definicija ne smije biti izražena slikovitim ni dvosmislenim jezikom.
4. Definicija ne smije biti cirkularna.
5. Definicija ne smije biti negativna ako može biti pozitivna.
6. Mora postojati barem jedan objekt kojeg definicija opisuje.

7.2 Aksiomi

Aksiom je polazna tvrdnja koja se smatra istinitom i koja se ne dokazuje. Pogledajmo nekoliko primjera aksioma.

A1. Cjelina je veća od dijela.

A2. Točkom izvan danog pravca može se povući jedinstveni pravac paralelan s tim pravcem.

A3. Za svaka dva pozitivna realna broja a i b postoji takav prirodni broj n da je $na > b$.

Postulat je polazna tvrdnja koja se također uzima bez dokaza. Postulat obično izražava uvjet koji mora zadovoljavati neki pojam ili izražava neki odnos među pojmovima. Evo jednog primjera postulata.

Linearni operator na V^3 je svako preslikavanje $f : V^3 \rightarrow V^3$ koje ima sljedeća svojstva:

- L1. $f(\alpha \vec{a}) = \alpha f(\vec{a})$ za svaki skalar $\alpha \in \mathbb{R}$ i svaki vektor $\vec{a} \in V^3$,
- L2. $f(\vec{a} + \vec{b}) = f(\vec{a}) + f(\vec{b})$ za svaki izbor vektora $\vec{a}, \vec{b} \in V^3$.

Tvrđnje L1 i L2 su postulati linearog operatora.

Ipak, u modernoj matematici se najčešće ne pravi razlika između postulata i aksioma.

7.3 Teoremi

Teorem (poučak) neke matematičke teorije je sud čija se istinitost utvrđuje dokazom, tj. logičkim zaključivanjem iz aksioma i već dokazanih teorema te teorije. U izgradnju neke matematičke teorije teoremi igraju važnu ulogu: oni proširuju i produbljuju znanje o tom području matematike i o njegovim objektima. Važno je napomenuti da se pod teoremom uvijek podrazumijeva istiniti sud.

U teoremu mora biti jasno istaknuto sljedeće:

1. uz koje se uvjete u njemu razmatra određeni objekt, te
2. što se o tomu objektu tvrdi.

Prema tomu, u formuliranju teorema razlikuju se dva dijela: *pretpostavka* (uvjet, hipoteza, premlisa) P i *tvrđnja* (zaključak, posljedica, konkluzija) Q . Ključne riječi su "**Ako je P , onda je Q .**"

Pogledajmo nekoliko primjera.

T1. Umnožak dvaju uzastopnih parnih brojeva a i b djeljiv je s 8.

P : a i b su uzastopni parni brojevi.

Q : Umnožak ab djeljiv je s 8.

T2. Dijagonale romba su okomite.

P : Dani četverokut je romb.

Q : Dijagonale toga četverokuta su okomite.

T3. Svaki obodni kut nad promjerom kružnice je pravi.

P : Dani kut je kut nad promjerom kružnice.

Q : Dani kut je pravi.

U matematici je teorem za koji postoji kratki i jednostavni dokaz uobičajeno zvati *propozicija*. Teoreme koji sami za sebe nisu od posebnog značaja, nego služe kao etape u dokazu nekog važnijeg teorema, nazivamo *lemama*. Konačno, teorem koji je neposredna i jednostavna posljedica drugog, prethodno dokazanog teorema, nazivamo *korolarom* toga teorema. Dokazi korolara su često toliko očiti da ih ni ne pišemo.

7.4 Dokazi

Postoje dvije osnovne vrste dokaza: *direktni dokaz* i *indirektni dokaz*.

Direktni dokaz neke tvrdnje Q sastoji se u tomu da se, polazeći od prepostavke P , primjenom aksioma, definicija i ranije dokazanih teorema nizom ispravnih logičkih zaključivanja dođe do Q . Pogledajmo jedan primjer.

Teorem. Zbroj kutova u svakom trokutu je 180^0 .

Proof. *P:* Neka je ABC po volji odabrani trokut, te označimo $\alpha = \angle CAB$, $\beta = \angle ABC$ i $\gamma = \angle ACB$.

Q: $\alpha + \beta + \gamma = 180^0$.

Vrhom C trokuta ABC povucimo paralelu DE s pravcem AB. Povlačenje ove paralele omogućava nam *Aksiom o paralelama* euklidske geometrije koji kaže da se točkom izvan danog pravca može povući jedinstveni pravac paralelan s danim pravcem.

Uočimo da kutovi $\angle DCA$ i $\angle CAB$, odnosno $\angle BCE$ i $\angle ABC$ imaju paralelne krakove.

Prema *Poučku o kutovima s paralelnim kracima* vrijedi

$$\begin{aligned}\angle DCA &= \angle CAB = \alpha, \\ \angle BCE &= \angle ABC = \beta.\end{aligned}$$

Kutovi $\angle DCA$, $\angle ACB$ i $\angle BCE$ zajedno tvore ispruženi kut, pa je

$$\alpha + \beta + \gamma = \angle DCA + \angle ACB + \angle BCE = 180^0.$$

■

Indirektni dokaz tvrdnje Q je direktni dokaz teorema u kome je pretpostavka negacija tvrdnje $\neg Q$, a tvrdnja neka očigledna neistina. Ako takav teorem dokažemo, onda po načelu isključenja trećega zaključujemo da je Q istinita.

Među indirektnim dokazima često se primjenjuju ova dva: dokaz svođenjem na kontradikciju i dokaz obratom po kontrapoziciji.

Pogledajmo najprije primjer dokaza *svođenjem na kontradikciju*.

Teorem. Ako su a i b pozitivni realni brojevi, onda je $(a + b) / 2 \geq \sqrt{ab}$.

Proof. Pretpostavimo da je $(a + b) / 2 < \sqrt{ab}$. Tada je

$$a + b < 2\sqrt{ab},$$

odnosno

$$a + b - 2\sqrt{ab} < 0.$$

Ovu nejednakost možemo zapisati kao

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 < 0,$$

što je očigledna neistina $\Rightarrow \Leftarrow$ (kontradikcija).

Dakle, vrijedi $(a + b) / 2 \geq \sqrt{ab}$. ■

U narednom dajemo primjer dokaza *obratom po kontrapoziciji*.

Teorem. Ako je $n \in \mathbb{N}$ i n^2 neparan broj, onda je i n neparan broj.

Proof. Pretpostavimo da je n paran broj. On je tada oblika $n = 2k$, za neki $k \in \mathbb{N}$. No iz ovoga slijedi $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, pa je n^2 paran broj. Ovo je u kontradikciji s početnom pretpostavkom da je n^2 neparan broj $\Rightarrow \Leftarrow$. Dakle, n mora biti neparan. ■

8 Algoritamska nasuprot dijalektičkoj matematici

Da bismo razumjeli razliku između algoritamskog i dijalektičkog stajališta u matematici, dat ćemo jedan primjer. Pretpostavimo da nas zanima problem nalaženja rješenja jednadžbe $x^2 = 2$. To je problem koji je mučio starogrčke matematičare: $\sqrt{2}$ postoji (kao diagonalna jediničnog kvadrata), a ipak ne postoji (kao racionalan broj).

Algoritamsko rješenje. Iz $x^2 = 2$ slijedi $x = 2/x$. Ako je x neznatno podcijenjen, onda će $2/x$ biti neznatno precijenjen. Na pola puta između podcijenjenog i precijenjenog biti će pravo rješenje. Dakle, definiramo li niz (x_n) kao

$$\begin{aligned} x_1 &= 1, \\ x_{n+1} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right), \quad n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

onda taj niz konvergira prema $\sqrt{2}$ kvadratnom brzinom.

Dijalektičko rješenje. Promotrimo graf funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirane izrazom

$$f(x) = x^2 - 2.$$

Za $x = 1$ je $f(x) = -1$, a za $x = 2$ je $f(x) = 2$. Kako se x neprekidno mijenja od -1 do 2 , tako se $f(x)$ neprekidno mijenja od negativne prema pozitivnoj vrijednosti. Stoga negdje između 1 i 2 mora biti vrijednost od x za koju je $f(x) = 0$, tj. $x^2 = 2$. Detalji argumentacije slijede iz svojstava sustava realnih brojeva i neprekidnih funkcija definiranih na njemu.

U izvjesnom smislu, ni prvo ni drugo rješenje nije uistinu rješenje. Prvo nam daje sve bolju i bolju aproksimaciju, no kad god stali, nećemo još imati posve točno rješenje. Drugo rješenje nam samo kaže da egzaktno rješenje postoji i da se nalazi između 1 i 2 , i to je sve.

9 Logika sudova

9.1 Uvod

Jedan od osnovnih problema u matematičkoj logici je ispitati istinitost neke rečenice (logičke forme) i to promatraljući samo njen oblik, a ne i sadržaj. Logika sudova, ili propozicijska logika, je jedna od najjednostavnijih formalnih teorija. U njoj rečenice promatramo kao forme sastavljene od "atomarnih" djelova koji su povezani veznicima: *ne*, *i*, *ili*, *ako...onda i ako i samo ako*.

Podsjetimo se: sud je svaka suvisla izjavna rečenica koja je istinita ili lažna, ali ne oboje. Ovo svakako ne može biti definicija suda, jer se može postaviti pitanje što je rečenica, ili pak što je istinita rečenica. Pogledajmo nekoliko primjera.

1. Rečenica "Dva plus dva je jednak četiri." jest sud, i to istinit.
2. Rečenica "Dva plus dva je jednak pet." jest sud, i to lažan.
3. Rečenica " x plus dva je jednak osam." nije sud, jer za nju ne možemo reći je li istinita ili lažna dok ne znamo koliko je x .
4. Rečenica "Koliko je sati?" nije sud, jer nije izjavna rečenica.

Sudovi (1) i (2) su jednostavnog oblika, tj. atomarni su. Pomoću veznika *ne*, *i*, *ili*, *ako...onda* i *ako i samo ako* možemo iz jednostavnih graditi složenije sudove. Na primjer rečenica "Ako pada kiša, onda nosim kišobran." je primjer složenog suda.

U logici sudova proučavamo i logička zaključivanja, te određujemo koja su korektna, a koja nisu. Promotrimo neke primjere. Zaključivanje:

Ako pada kiša, onda nosim kišobran.

Pada kiša.

Nosim kišobran.

je primjer korektnog zaključivanja i nazivamo ga *modus ponens*. Formalno zapisano, ono je oblika

$$\frac{\begin{array}{c} A \longrightarrow B \\ A \end{array}}{B} .$$

No zaključivanje:

U nedjelju ću ići u kino.
Danas nije nedjelja.

Danas ne idem u kino.

nije korektno. Formalno ga zapisujemo kao

$$\begin{array}{c} A \longrightarrow B \\ -A \\ \hline -B \end{array} .$$

Dakle, važno je razlučiti koje je zaključivanje korektno, odnosno što je logička posljedica.

Formalno matematičko zaključivanje čini se sitničavim ako ga usporedimo s dokazivanjem u svakodnevnoj praksi u kojoj je intuitivna matematička mjera strogosti najčešće dovoljna. Međutim u slučajevima sumnje ili spora valja pribjeći većoj strogosti.

9.2 Jezik logike sudova

Sada ćemo definirati koji su osnovni znakovi logike sudova i kako gradimo formule: kada je to zadano smatramo da je zadan jezik teorije. No prije definicije formula uest ćemo još neke pojmove.

Abeceda, ili *alfabet*, je proizvoljan neprazan skup. Svaki element abecede je simbol ili *znak*. *Riječ* u nekoj abecedi je bilo koji konačan niz znakova iz dane abecede. Ako je A neka abeceda, onda s A^* označavamo skup svih riječi u abecedi A . Po dogovoru smatramo da skup svih riječi proizvoljne abecede sadrži praznu riječ ε . Najvažnija operacija na skupu riječi je *konkatenacija*: ako su a i b oznake za riječi, onda kažemo da je riječ ab nastala konkatenacijom riječi a i b .

PRIMJER. Neka je $A = \{\alpha, \beta\}$. Tada u A^* možemo naći riječi: $\alpha\alpha\beta\alpha$ i $\beta\alpha\beta\beta\alpha$. Njihovom konkatenacijom možemo dobiti riječ $\alpha\alpha\beta\alpha\beta\alpha\beta\beta\alpha$ koja je također u A^* .

Abeceda logike sudova je unija skupova A_1 , A_2 i A_3 , gdje je:

1. $A_1 = \{P_0, P_1, P_2, \dots\}$ prebrojiv skup čije elemente nazivamo *propozicijskim varijablama*,
2. $A_2 = \{-, \wedge, \vee, \longrightarrow, \longleftrightarrow\}$ skup *logičkih veznika*,
3. $A_3 = \{(,)\}$ skup pomoćnih simbola.

Logičke veznike nazivamo redom: negacija ($-$), konjukcija (\wedge), disjunkcija (\vee), kondicional (\longrightarrow) i bikondicional (\longleftrightarrow).

Sada ćemo definirati najvažnije riječi abecede logike sudova, a to su formule.

DEFINICIJA. Atomarna formula je svaka propozicijska varijabla. Formula je definirana sa:

- a) svaka atomarna formula je formula,
- b) ako su A i B formule, onda su i riječi $(\neg A)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ i $(A \leftrightarrow B)$ formule,
- c) riječ abecede logike sudova je formula ako i samo ako je nastala primjenom konačno mnogo koraka pravila a) i b).

NAPOMENA. Primijetimo da u prethodnoj definiciji A i B nisu formule, već samo oznake za formule. Općenito ćemo formule označavati velikim latiničnim slovima s početka abecede (A, B, C, F, G, \dots), dok ćemo za propozicijske varijable koristiti velika latinična slova s kraja abecede (P, Q, R, S, V, \dots).

Da bismo izbjegli pisanje velikog broja zagrada uvest ćemo prioritet logičkih veznika: najveći prioritet ima negacija, zatim konjukcija i disjunkcija, a najmanji prioritet imaju kondicional i bikondicional. Na primjer, formulu $((\neg P) \wedge Q) \rightarrow R$ pišemo kao $(\neg P \wedge Q) \rightarrow R$.

9.3 Semantika

Svako preslikavanje sa skupa propozicijskih varijabli u skup $\{0, 1\}$ nazivamo *interpretacija*. Sada po složenosti formule definiramo interpretacije na proizvoljnim formulama u skladu s danom semantičkom tablicom:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Ako je vrijednost interpretacije I na formuli F jednaka 1, tj. $I(F) = 1$, onda kažemo da je formula F istinita za interpretaciju I . Ako je vrijednost interpretacije I na formuli F jednaka 0, tj. $I(F) = 0$, onda kažemo da je formula F neistinita za interpretaciju I .

PRIMJER. Neka je $I(P) = I(Q) = 0$ i $I(R) = 1$. Odredimo $I(F)$, gdje je $F \equiv (-P \vee Q) \rightarrow -R$.

P	Q	R	$-P$	$-P \vee Q$	$-R$	$(-P \vee Q) \rightarrow -R$
0	0	1	1	1	0	0

Dakle, $I(F) = 0$. Naravno, za neke druge $I(P)$, $I(Q)$ i $I(R)$ imali bi različitu $I(F)$.

Pogledajmo sve moguće interpretacije:

P	Q	R	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$\neg R$	$(\neg P \vee Q) \longrightarrow \neg R$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0

Uočimo da smo ovakvom tablicom formuli F pridružili funkciju sa skupa $\{0, 1\}^3$ na skup $\{0, 1\}$. Takvu funkciju nazivamo *istinosnom funkcijom*.

DEFINICIJA. Za formulu F kažemo da je *ispunjiva*, odnosno *oboriva*, ako postoji interpretacija I za koju je $I(F) = 1$, odnosno $I(F) = 0$.

Za formulu F kažemo da je *valjana* (ili da je tautologija) ako je istinita za svaku interpretaciju.

Za formulu F kažemo da je *antitautologija* ako je neistinita za svaku interpretaciju.

Uočimo da su valjane formule upravo one formule koje su istinite bez obzira na istinitost svojih atomarnih djelova. Sada ćemo navesti neke važne formule koje su valjane.

1. $\neg\neg P \longleftrightarrow P$, princip dvojne negacije,
2. $P \vee \neg P$, princip isključenja trećeg,
3. $\neg(P \wedge \neg P)$, princip neproturječnosti,
4. $(P \rightarrow Q) \longleftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$, princip kontrapozicije,
5. $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$, princip negacije premise,
6. $\neg(P \vee Q) \longleftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$, De Morganov princip,
7. $\neg(P \wedge Q) \longleftrightarrow \neg P \vee \neg Q$, De Morganov princip.

9.4 Logička implikacija

DEFINICIJA. Kažemo da formula B logički slijedi iz formule A (ili da A logički implicira B), i pišemo $A \Rightarrow B$, ako za svaku interpretaciju I za koju je $I(A) = 1$ vrijedi $I(B) = 1$.

DEFINICIJA. Kažemo da su formule A i B logički ekvivalentne, i pišemo $A \Leftrightarrow B$, ako za svaku interpretaciju I vrijedi $I(A) = I(B)$.

Nije teško vidjeti da za proizvoljne formule A i B vrijedi

$$A \Rightarrow B \text{ ako i samo ako } A \rightarrow B \text{ je valjana formula.}$$

Drugim riječima, implikacija se može svesti na valjanost kondicionala. Analogno,

$$A \Leftrightarrow B \text{ ako i samo ako } A \leftrightarrow B \text{ je valjana formula,}$$

tj. ekvivalencija se može svesti na valjanost bikondicionala.

Lako je provjeriti da vrijedi:

1. Svaka formula implicira samu sebe.
2. Ako $A \Rightarrow B$ i $B \Rightarrow C$, onda $A \Rightarrow C$ (*hipotetički silogizam*).
3. Antitautologija implicira svaku formulu, a logički slijedi samo iz antitautologije.
4. Valjana formula logički slijedi iz svake formule, a implicira samo valjane formule.
5. Logička ekvivalencija je uzajamna implikacija.
6. Svaka formula je logički ekvivalentna samoj sebi.
7. Ako je $A \Leftrightarrow B$, onda je $B \Leftrightarrow A$.
8. Ako je $A \Leftrightarrow B$ i $B \Leftrightarrow C$, onda je $A \Leftrightarrow C$.
9. Valjane formule su sve međusobno logički ekvivalentne.
10. Antitautologije su sve međusobno logički ekvivalentne.

Kao što smo vidjeli, logička implikacija je usko vezana uz kondicional. To je dovelo do tendencije da se "implicira" koristi za čitanje znaka " \rightarrow " za kondicional, što nikako nije ispravno! Naime, kada kažemo da jedna formula implicira drugu izričemo određenu tvrdnju o tim formulama, a kada među njima stavimo znak " \rightarrow " gradimo složeniju formulu. Slično vrijedi i za logičku ekvivalenciju i znak " \longleftrightarrow ".

Pogledajmo sada u kakvoj su vezi logička implikacija i dokaz nekog matematičkog teorema s pretpostavkom P i tvrdnjom Q . U logičkoj notaciji to možemo pisati kao $P \Rightarrow Q$. Uz ovo su vezana sljedeća tri suda:

1. $Q \Rightarrow P$ (*obrat suda*),
2. $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (*obrat suda po kontrapoziciji*),
3. $\neg P \Rightarrow \neg Q$ (*suprotni sud*).

Zanima nas kakva je veza među njima? Podsjetimo se da $P \Rightarrow Q$ ako i samo ako je $P \rightarrow Q$ valjana formula, pa možemo ispitati njihovu vezu pomoću semantičke tablice.

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$Q \rightarrow P$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

Zaključujemo:

1. P logički implicira Q ako i samo ako $\neg Q$ logički implicira $\neg P$.
2. Ako P logički implicira Q , onda ne mora Q logički implicirati P .
3. Ako P logički implicira Q , onda ne mora $\neg P$ logički implicirati $\neg Q$.

Upravo zbog 1) možemo provoditi dokaz obratom po kontrapoziciji.

10 Logika prvog reda

10.1 Uvod

U prethodnom poglavlju proučavali smo klasičnu logiku sudova. No mnoga logička zaključivanja koja koristimo u svakodnevnom životu ne možemo izraziti u logici sudova. Pogledajmo jedan primjer.

Svi ljudi su smrtni.

Grci su ljudi.

Grci su smrtni.

Lako je vidjeti da ovo jednostavno zaključivanje ne možemo opisati formulama logike sudova, već moramo u obzir uzeti i sadržaj rečenica (što ne želimo!).

Označimo redom predikate:

$C(x) \dots "x \text{ je čovjek}",$

$S(x) \dots "x \text{ je smrtan}",$

$G(x) \dots "x \text{ je Grk}".$

U tom slučaju gornji primjer možemo zapisati u obliku:

$$\frac{\begin{array}{c} \forall x (C(x) \rightarrow S(x)) \\ \forall x (G(x) \rightarrow C(x)) \end{array}}{\forall x (G(x) \rightarrow S(x))}.$$

Sljedeći primjer bio je nerješiv za srednjovjekovne logičare. Pomoću Aristotelovih silogizama nisu uspjevali zapisati ovo očito valjano zaključivanje.

Sve elipse su krivulje.

Svatko tko crta elipsu crta krivulju.

Uvedemo li opet oznaće

$E(x) \dots "x \text{ je elipsa}",$

$K(x) \dots "x \text{ je krivulja}",$

$C(x, y) \dots "y \text{ crta } x",$

onda gornji primjer možemo pisati kao

$$\frac{\forall x (E(x) \rightarrow K(x))}{\forall y (C(x, y) \wedge E(x) \rightarrow C(x, y) \wedge K(x))}$$

Logika sudova ne može formalno zapisati ni neke osnovne matematičke pojmove. Jedan takav primjer je pojam neprekidnosti u točki. Neka je funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u točki x_0 . Tada je istinita formula

$$\forall \varepsilon \exists \delta \forall x (|x - x_0| < \delta \longrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Negacija gornje formule, tj. formula

$$\neg \forall \varepsilon \exists \delta \forall x (|x - x_0| < \delta \longrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

je formalni zapis činjenice da funkcija f ima prekid u točki x . Primjenom pravila prijelaza za kvantifikatore dobivamo

$$\exists \varepsilon \forall \delta \exists x (|x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon).$$

Važno je uočiti da u prethodnim primjerima istinitost zaključaka ne ovisi o istinitosti djelova koji su dobiveni samo rastavljanjem s obzirom na logičke veznike. To znači da za opis ovakvih zaključivanja moramo prije svega usvojiti širi jezik.

Ovako dobivena logika, koju nazivamo *logikom prvog reda* ili *predikatnom logikom*, ima veću izražajnu moć, no gubi neka dobra svojstva logike sudova, a tu prije svega mislimo na odlučivost. Za svaku formulu logike sudova možemo u konačno mnogo koraka provjeriti je li valjana, no to nije moguće za formule logike prvog reda.

10.2 Jezik logike prvog reda

Abeceda \mathcal{A} logike prvog reda je unija skupova A_1, \dots, A_6 , gdje je:

1. $A_1 = \{v_0, v_1, v_2, \dots\}$ prebrojiv skup čije elemente nazivamo *individualnim varijablama*,
2. $A_2 = \{-, \wedge, \vee, \longrightarrow, \longleftrightarrow, \forall, \exists\}$ skup *logičkih veznika*,
3. $A_3 = \{R_k : k \in \mathbb{N}\}$ skup čije elemente nazivamo *relacijskim simbolima* (predikatima),
4. $A_4 = \{f_k : k \in \mathbb{N}\}$ skup čije elemente nazivamo *funkcijskim simbolima*,
5. $A_5 = \{c_k : k \in \mathbb{N}\}$ skup čije elemente nazivamo *konstantskim simbolima*,
6. $A_6 = \{(,)\}$ skup pomoćnih simbola.

Veznik \forall nazivamo *univerzalnim kvantifikatorom* i čitamo ga "za svaki", dok veznik \exists nazivamo *egzistencijalnim kvantifikatorom* i čitamo ga "postoji (neki)". Smatramo da je za svaki od relacijskih i funkcijskih simbola poznato kolika im je mjesnost. Npr. dvomesni funkcijski simbol se interpretira kao funkcija dvije varijable.

DEFINICIJA. *Term* je riječ dane abecede \mathcal{A} za koju vrijedi:

- a) svaka individualna varijabla i svaki konstantski simbol iz \mathcal{A} je term,
- b) ako je f n -mjesni funkcijski simbol iz \mathcal{A} i t_1, \dots, t_n termi, onda je i $f(t_1, \dots, t_n)$ term,
- c) riječ abecede \mathcal{A} je term ako i samo ako je nastala primjenom konačno mnogo koraka pravila a) i b).

Na primjer, uzimimo $\{\ln, \sin, \exp\} \subset A_4$, $\{v_1, x\} \subset A_1$ i $c_3 \in A_5$. Sljedeće su riječi termi: c_3 , x , $\ln x$, $\exp(\sin v_1)$, $\ln(\exp(\sin c_3))$.

DEFINICIJA. Ako je R n -mjesni relacijski simbol iz \mathcal{A} i t_1, \dots, t_n termi, onda je $R(t_1, \dots, t_n)$ *atomarna formula* abecede \mathcal{A} . Formula u abecedi \mathcal{A} je definirana sa:

- a) svaka atomarna formula je formula,
- b) ako su A i B formule, onda su i riječi $(\neg A)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ i $(A \leftrightarrow B)$ formule,
- c) ako je A formula i x varijabla, onda su riječi $(\forall x A)$ i $(\exists x A)$ formule,
- d) riječ abecede \mathcal{A} je formula ako i samo ako je nastala primjenom konačno mnogo koraka uvjeta a), b) i c).

NAPOMENA. Uobičajeno je umjesto $\exists x (x \in S \wedge P(x))$ pisati $(\exists x \in S) P(x)$, a umjesto $\forall x (x \in S \rightarrow P(x))$ analogno pišemo $(\forall x \in S) P(x)$. Dakle, treba uvijek voditi računa o tomu da se radi samo o uvriježenim zapisima.

Pogledajmo jedan primjer: neka je R dvomjesni relacijski simbol koji interpretiramo kao "biti jednak" na skupu realnih brojeva \mathbb{R} . Npr. $R(x, y)$ bismo čitali " x je jednak y ", a $R(x, 2)$ bismo čitali " x je jednak 2". Također, $R(1, 3)$ bismo čitali "1 je jednako 3", i to bi (za razliku od prethodna dva primjera) bio sud, i to lažan. " x je jednak 2" nije sud jer ne možemo utvrditi da li je ova izjavna rečenica istinita ili lažna, a isto vrijedi i za izjavnu rečenicu " x je jednak y ". No uvođenjem odgovarajućeg broja kvantifikatora u gradnju formule kojoj je podformula $R(t_1, t_2)$, dobit ćemo sude.

Na primjer,

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) R(x, y)$$

je neistina, dok su

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) R(x, y),$$

$$(\exists x \in \mathbb{R}) R(x, 2)$$

istine.

Ovo su bili primjeri *zatvorenih* formula, tj. formula kod kojih su sve varijable vezane kvantifikatorima, no definicija formule dozvoljava i *otvorene* formule, tj. formule kod kojih nisu sve varijable vezane kvantifikatorima. Jedna takva bi bila

$$(\forall x \in \mathbb{R}) R(x, y).$$

Slično kao i prije poštivat ćemo prioritet logičkih veznika, s tim što sada veznici \forall i \exists imaju najveći i međusobno jednak prioritet.

Pogledajmo još neke primjere korektnih formula:

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) x \geq 0$ (ovaj sud je lažan),
2. $(\exists x \in \mathbb{N}) x$ je paran (ovaj sud je istinit),
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) y \geq x$ (ovaj sud je istinit).

Posebnu pažnju treba posvetiti negaciji kvantifikatora. Lako se vidi da vrijedi:

1. $\neg \forall x A \Leftrightarrow \exists x (\neg A),$
2. $\neg \exists x A \Leftrightarrow \forall x (\neg A).$

Pogledajmo u nekoliko primjera kako se provodi negacija formula koje sadrže kvantifikatore:

1. $\neg \forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow R(x, y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y (P(x, y) \wedge \neg R(x, y))$,
2. $\neg (\forall x \in A) (\forall y \in A) (x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y))$
 $\Leftrightarrow (\exists x \in A) (\exists y \in A) (x \neq y \wedge f(x) = f(y))$,
3. $\neg (\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) x^2 + y^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\exists x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) x^2 + y^2 < 0$.

11 Skupovi: osnovni pojmovi

Skup je osnovni pojam u matematici koga je nemoguće definirati uz pomoć jednostavnijih pojmova, no intuitivno je jasno što podrazumijevamo pod pojmom "skup". Možemo reći da je to "množina", "mnoštvo", "kolekcija", "familija" ili slično, no time rekli ništa novo, već smo samo koristili sinonime. Matematička disciplina koja se bavi skupovima zove se *teorija skupova*. Njen osnivač Georg Cantor o skupu je rekao sljedeće:

"Skup je mnoštvo koje shvaćamo kao jedno."

Prema tomu, skup možemo smatrati cjelinom sastavljenom od za tu cjelinu osnovnih djelova. Intuitivno pretpostavljamo da postoji određeni odnos između skupa i njegovih elemenata. I ne samo to, za svaki objekt možemo reći pripada li nekom skupu ili ne. Skupove ćemo u matematici najčešće označavati velikim latiničnim slovima A, B, C, X, Y, \dots

Osnovne djelove koji čine neki skup (objekte koji se po nekom kriteriju ujedinjuju u cjelinu) zovemo *elementima* (članovima) toga skupa, a označavamo ih malim latiničnim slovima a, b, c, x, y, \dots . Pojam "*biti element skupa*" je također osnovni pojam u matematici. Činjenicu da je x element skupa S zapisujemo kao $x \in S$ i čitamo " x je element skupa S " ili " x pripada skupu S ". Slično, činjenicu da y nije element skupa S zapisujemo kao $y \notin S$ i čitamo " y nije element skupa S " ili " y ne pripada skupu S ". Na primjer, označimo li sa S skup svih riba u Jadranskom moru, onda vrijedi: tunj $\in S$, pirana $\notin S$, srdela $\in S$.

Definirajmo sada neke osnovne pojmove vezane uz skupove.

DEFINICIJA. Neka su A i B skupovi. Ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B , onda kažemo da je skup A podskup skupa B (ili da je skup A sadržan u skupu B) i pišemo $A \subseteq B$. Kažemo još i da je skup B nadskup skupa A (ili da skup B sadrži skup A), a to pišemo kao $B \supseteq A$. Oznaku \subseteq čitamo kao "inkluzija".

DEFINICIJA. Ako je $A \subseteq B$ i ako postoji neki $b \in B$ takav da $b \notin A$, onda kažemo da je skup A pravi podskup skupa B i pišemo $A \subset B$.

DEFINICIJA. Kažemo da je skup A jednak skupu B i pišemo $A = B$ ako je svaki element skupa A ujedno i element skupa B , te ako je svaki element skupa B ujedno i element skupa A .

Očito je

$$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A),$$

pa prema tomu provjeriti da li su dva skupa A i B jednaka znači provjeriti da li je $A \subseteq B$ i $B \subseteq A$.

Ukoliko dva skupa A i B nisu jednakia pišemo $A \neq B$. Očito je da vrijedi

$$A \neq B \Leftrightarrow (A \not\subseteq B \vee B \not\subseteq A),$$

pri čemu je

$$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists a (a \in A \wedge a \notin B).$$

PROPOZICIJA. Neka su A, B i C bilo koji skupovi. Vrijedi:

1. $A \subseteq A$,
2. $(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$,
3. $(A = B \wedge B = C) \Rightarrow A = C$.

Dokazi slijede direktno iz definicija.

U mnogim situacijama je potrebno promatrati samo podskupove nekog skupa U , koji tada poprima značenje *univerzalnog skupa* (univerzuma). Naravno, univerzalnost skupa U je relativna i varira od problema do problema. Drugi važni istaknuti skup je *prazni skup*, tj. skup bez ijednog elementa. Označavamo ga s \emptyset .

Skupove i njihove međusobne odnose ponekad zorno prikazujemo tzv. *Vennovim dijagramima*. Ipak, važno je istaknuti da takvi crteži ne predstavljaju dokaz.

12 Zadavanje skupova

Skup smatramo *zadanim* ako je nedvosmisleno rečeno, objašnjeno ili specificirano što su elementi toga skupa. Prema tomu, zadati neki skup znači dati zakon, ogranočenje, propis, specifikaciju ili svojstvo kojim se točno određuju članovi toga skupa.

Skupove možemo zadati na više načina:

1. Navođenjem potpune liste elemenata toga skupa unutar para vitičastih zagrada.

Na primjer, skup samoglasnika u hrvatskom jeziku je skup $S = \{a, e, i, o, u\}$. Pri tomu poredak nije važan i ponovljene elemente ne uzimamo u obzir osim ako se radi o *multiskupovima*. Vitičaste zgrade igraju dvostruku ulogu: one su simbol ujedinjavanja djelova u cjelinu i klasifikator objekata na one koji koji pripadaju skupu i na one koji mu ne pripadaju.

2. Iстicanjem nekog karakterističnog svojstva koje imaju samo elementi toga skupa, tj. propisom.

Na primjer, skup svih pozitivnih cijelih brojeva zadajemo sa $\mathbb{Z}_+ = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\}$, a centralnu, jediničnu kružnicu sa $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.

13 Booleove operacije na skupovima

DEFINICIJA. Neka je U proizvoljan skup. *Partitivni skup* skupa U , u oznaci $\mathcal{P}(U)$, je skup svih podskupova skupa U . Često pišemo i 2^U .

Na primjer,

1. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$,
2. $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$,
3. $\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

Uvedimo sada neke operacije sa skupovima.

DEFINICIJA. Neka je U dani skup i A, B njegovi podskupovi.

a) *Unija skupova A i B , u oznaci $A \cup B$, je skup*

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}.$$

b) *Presjek skupova A i B , u oznaci $A \cap B$, je skup*

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

c) *Razlika skupova A i B , u oznaci $A \setminus B$, je skup*

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Ove osnovne operacije sa skupovima nazivamo *Booleovim operacijama*. Uočimo odmah da je

$$(\forall A, B \in \mathcal{P}(U)) (A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{P}(U)).$$

Također

$$(\forall A, B \subseteq U) (A \cap B \subseteq A, B \subseteq A \cup B).$$

DEFINICIJA. Neka je U dani skup i $A, B \subseteq U$. Kažemo da su skupovi A i B *disjunktni* ako je $A \cap B = \emptyset$.

TEOREM. Neka je U proizvoljan skup i $A, B \subseteq U$. Vrijedi

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Sada ćemo uvesti i jednu unarnu operaciju sa skupovima.

DEFINICIJA. Neka je U dani skup i $A \subseteq U$. *Komplement* skupa A u odnosu na skup U , u oznaci A^c , je skup

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Uočimo da je za svaki $A \subseteq U$ ispunjeno $A^c \subseteq U$.

Pogledajmo jedan primjer: ako je $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ i $A = \{2, 5, 6\}$, onda je $A^c = \{1, 3, 4, 7\}$.

VJEŽBA. Neka je U dani skup i $A, B \subseteq U$. Uočimo da vrijedi sljedeće:

1. $U^c = \emptyset$, $\emptyset^c = U$,
2. $A \setminus B = A \cap B^c$,
3. $A = B \Leftrightarrow A^c = B^c$.

Pogledajmo sada koja svojstva imaju Booleove operacije.

TEOREM. Neka je U dani skup i $A \subseteq U$. Vrijedi:

1. $A \cup A = A, A \cap A = A$ (*idempotentnost*),
2. $A \cup U = U, A \cap \emptyset = \emptyset$,
3. $A \cup \emptyset = A, A \cap U = A$,
4. $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$,
5. $(A^c)^c = A$ (*involutornost*).

TEOREM. Neka je U dani skup i $A, B \subseteq U$. Vrijedi:

1. $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$ (komutativnost),
2. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (de Morganove formule).

Analogno se mogu dokazati i sljedeća svojstva Booleovih operacija:

TEOREM. Neka je U dani skup i $A, B, C \subseteq U$. Vrijedi:

1. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (*asocijativnost*),
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (*distributivnost*).

Dokaz sami za vježbu.

VJEŽBA. Neka je U dani skup i $A, B, C \subseteq U$. Dokažite da vrijedi:

1. $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$,
2. $A \cap B^c$ i B su disjunktni,
3. $A \cup B = (A \cap B^c) \cup B$ (unija prikazana kao unija dvaju disjunktnih skupova),
4. $A \cap B$ i $A \cap B^c$ su disjunktni skupovi,
5. $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$ (skup prikazan kao unija dvaju disjunktnih skupova),
6. $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$.

Partitivni skup $\mathcal{P}(U)$ zajedno s operacijama \cup , \cap i \setminus zove se *Booleova algebra skupova na U* .

NAPOMENA. Pojam unije i presjeka dvaju skupova može se poopćiti na više skupova.
Neka je \mathcal{F} neka familija skupova.

a) *Unija skupova familije \mathcal{F} , u oznaci $B = \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$, je skup definiran sa*

$$x \in B \Leftrightarrow (\exists A \in \mathcal{F}) x \in A.$$

b) *Presjek skupova familije \mathcal{F} , u oznaci $D = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$, je skup definiran sa*

$$x \in D \Leftrightarrow (\forall A \in \mathcal{F}) x \in A.$$

I u ovom slučaju vrijede de Morganove formule

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A \right)^c &= \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A^c, \\ \left(\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A \right)^c &= \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A^c. \end{aligned}$$

U jednom zadatku prikazali smo skupove $A \cup B$ i A kao unije disjunktnih skupova. Ovakav rastav je često od velike pomoći, pa ćemo ga poopćiti u sljedećoj definiciji.

DEFINICIJA. Neka je $A \neq \emptyset$ proizvoljan skup. *Particija skupa A* je bilo koja familija $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ koja ima svojstva:

- a) $(\forall X \in \mathcal{F}) \quad X \neq \emptyset,$
- b) $(\forall X, Y \in \mathcal{F}) \quad (X \cap Y = \emptyset \vee X = Y),$
- c) $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A.$

Dakle, \mathcal{F} je particija skupa A ako i samo ako za svaki $x \in A$ postoji jedinstveni skup $X \in \mathcal{F}$ takav da je $x \in X$.

Na primjer, $\mathcal{F}_1 = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}\}$ i $\mathcal{F}_2 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ su dvije particije skupa $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

Osim Booleovih operacija, na $\mathcal{P}(A)$ se mogu definirati i neke druge operacije, a jedna od njih je *simetrična razlika skupova*.

DEFINICIJA. Neka je U dani skup i $A, B \subseteq U$. *Simetrična razlika* skupova A i B , uoznaci $A \triangle B$, je skup definiran sa:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Očito je $A \triangle B \subseteq U$ za svaki izbor $A, B \subseteq U$.

VJEŽBA. Neka je U dani skup i $A, B \subseteq U$. Dokažite da vrijedi:

1. $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$,
2. $A \triangle B = B \triangle A$,
3. $(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$,
4. $A \triangle \emptyset = \emptyset \triangle A = A$,
5. $A \triangle A = \emptyset$.

14 Kartezijev umnožak skupova

U ovom ćemo se odjeljku upoznati s još jednim važnim načinom izgradnje novih skupova. Neka su $A, B \neq \emptyset$ proizvoljni skupovi, te $a \in A, b \in B$. Objekt (a, b) nazivamo *uređenim parom*, pri čemu je a prvi član (prva koordinata) uređenog para, a b drugi član (druga koordinata) uređenog para (a, b) . Uočimo da je važan poredak članova uređenog para. Stroga matematička definicija uređenog para glasi ovako:

DEFINICIJA. Neka su A i B neprazni skupovi, te $a \in A, b \in B$. *Uređeni par* elemenata a i b , u oznaci (a, b) , je skup

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Važno je znati kada su dva uređena para jednaka. To nam govori sljedeći teorem.

TEOREM. Dva uređena para (a, b) i (a', b') su jednaka ako i samo ako je $a = a'$ i $b = b'$.

NAPOMENA. Uočimo da je općenito $(a, b) \neq (b, a)$. Štoviše, iz $(a, b) = (b, a)$ slijedi $a = b$. Za razliku od toga, $\{a, b\} = \{b, a\}$.

DEFINICIJA. Neka su A i B neprazni skupovi. *Kartezijev (ili direktni) umnožak* skupova A i B , u oznaci $A \times B$, je skup definiran sa

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

Skupove A i B nazivamo faktorima Kartezijeva umnoška. Ako je barem jedan od skupova A i B prazan, dogovorno uzimamo $A \times B = \emptyset$.

PRIMJER. Neka je $A = \{\alpha, \beta\}$ i $B = \{1, 2, 3\}$.

$$\begin{aligned}A \times B &= \{(\alpha, 1), (\alpha, 2), (\alpha, 3), (\beta, 1), (\beta, 2), (\beta, 3)\}, \\B \times A &= \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \alpha), (2, \beta), (3, \alpha), (3, \beta)\}.\end{aligned}$$

Iz gornjeg primjera je jasno da Kartezijsko množenje nije komutativna operacija. Posebno je zanimljivo Kartezijsko množenje skupa sa samim sobom.

DEFINICIJA. Neka je A neprazan skup. *Kartezijev kvadrat* skupa A , u oznaci A^2 , je skup definiran sa

$$A^2 = A \times A = \{(a, b) : a, b \in A\},$$

a njegova dijagonala je skup

$$I_A = \{(a, a) : a \in A\}.$$

Očito je $I_A \subseteq A^2$ i $I_A \neq A^2$ čim A ima više od jednog elementa.

PRIMJER. Dva poznata primjera su:

1. $A = B = \mathbb{R}$ (koordinatna ravnina)

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\},$$

2. $A = B = [0, 1]$ (jedinični kvadrat u koordinatnoj ravnini)

$$[0, 1]^2 = \{(x, y) : x, y \in [0, 1]\}.$$

Operacija Kartezijeva množenja ima neka svojstva vezana uz Booleove operacije.

TEOREM. Neka su A, B, C proizvoljni skupovi. Vrijedi:

1. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$,
2. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$,
3. $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$.

Dokaz sami za vježbu.

Pojam Kartezijeva umnoška možemo poopćiti i na više od dva faktora.

Ako je $n \in \mathbb{N}$ i A_1, A_2, \dots, A_n neprazni skupovi, definiramo

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\},$$

pri čemu (a_1, a_2, \dots, a_n) zovemo *uređena n-torka*. Ako je bilo koji od skupova A_i , $i = 1, 2, \dots, n$, prazan, definiramo $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \emptyset$.

Naravno, možemo Kartezijev umnožak n skupova definirati i induktivno kao

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = (A_1 \times A_2) \times A_3,$$

:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1} \times A_n = (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n-1}) \times A_n.$$

Odatle posebno slijedi

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a'_1, a'_2, \dots, a'_n) \Leftrightarrow a_1 = a'_1 \wedge \cdots \wedge a_n = a'_n.$$

VJEŽBA. Uvjerite se da Kartezijev umnožak nije asocijativan, tj. da postoje skupovi X, Y, Z takvi da je $(X \times Y) \times Z \neq X \times (Y \times Z)$. Dakle, ne valja definirati ovako

$$(x, y, z) = \{\{x\}, \{x, y\}, \{x, y, z\}\}.$$

PRIMJER. Dva poznata primjera su:

1. $A = B = C = \mathbb{R}$ (koordinatni prostor)

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\},$$

2. $A = B = C = [0, 1]$ (jedinična kocka u koordinatnom prostoru)

$$[0, 1]^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in [0, 1]\}.$$

15 Relacije: osnovni pojmovi

Pojam *relacija* je jedan od najvažnijih pojmova matematike uopće, a kao poseban slučaj sadrži pojam funkcije.

Primjeri iz svakidašnjeg života pokazuju da je često potrebno između dvaju skupova A i B uspostaviti nekakav odnos.

Neka je npr. A skup svih dnevnih listova koji izlaze u Splitu i neka je B skup svih stanovnika grada Splita. Između skupova A i B postoji izvjestan odnos koji se sastoji u tomu da neki stanovnici Splita čitaju neke dnevne listove: pri tomu neki čitaju samo jedan, a neki i više njih. Postoje također i oni stanovnici Splita koji ne čitaju nijedan dnevni list. Ako nam $s \in A$ označava *Slobodnu Dalmaciju*, onda je s u vezi s određenim brojem elemenata skupa B , tj. s određenim brojem stanovnika Splita. To su upravo oni $b \in B$ koji čitaju *Slobodnu Dalmaciju*.

Pogledajmo još jedan primjer: neka je sada $A = \{a, b, c, d\}$ društvo od četiri osobe, a $B = \{e, f, g\}$ neko drugo društvo od tri osobe. Između ta dva društva možemo uspostaviti odnos "poznavanja". Pretpostavimo da osoba a poznaje osobe e i g , osoba b poznaje osobu f , osoba c poznaje osobe e , f i g , a osoba d ne poznaje nikoga od njih. Na ovaj je način putem "poznavanja" ustanoavljen (uočen) odnos između skupova A i B . Prirodno je promatrati umnožak $A \times B$ jer se u njemu javljaju sve mogućnosti poznavanja. Imamo:

$$\begin{aligned} A \times B = & \{(a, e), (a, f), (a, g), (b, e), (b, f), (b, g), \\ & (c, e), (c, f), (c, g), (d, e), (d, f), (d, g)\}. \end{aligned}$$

Odredimo li da su u parovima samo osobe koje se "poznaju", onda dobijemo skup

$$R = \{(a, e), (a, g), (b, f), (c, e), (c, f), (c, g)\} \subseteq A \times B.$$

Ovi primjeri ukazuju na potrebu proučavanja proizvoljnih podskupova Kartezijeva umnoška $A \times B$.

DEFINICIJA. Neka su A i B skupovi. Svaki podskup R Kartezijeva umnoška $A \times B$ zove se (binarna) *relacija*. Skup A označavamo kao $D_1(R)$, a skup B kao $D_2(R)$. Za element $a \in A$ kažemo da je u relaciji R s $b \in B$ ako i samo ako je $(a, b) \in R$. *Domena relacije* R je skup

$$D(R) = \{a \in A : (\exists b \in B) (a, b) \in R\},$$

a *slika relacije* R skup

$$K(R) = \{b \in B : (\exists a \in A) (a, b) \in R\}.$$

Činjenicu da je $(a, b) \in R$ često pišemo u obliku aRb i kažemo da a ima svojstvo da je u relaciji R s b .

Ako je $A \neq B$ kažemo da je $R \subseteq A \times B$ *heterogena relacija*, a ako je $A = B$ kažemo da je $R \subseteq A \times A$ *homogena relacija* na skupu A .

Posebno izdvajamo homogenu relaciju I_A (nekad i u oznaci Δ_A), koja je za bilo koji neprazan skup A definirana sa

$$I_A = \{(a, a) : a \in A\},$$

a koju zovemo *dijagonalna* ili *identična relacija* na skupu A .

Na sličan način se definicija binarne relacije može proširiti na podskupove Kartezijeva produkta $A_1 \times \cdots \times A_n$, $n \in \mathbb{N}$, u kojem slučaju govorimo o *n-arnim relacijama*. Za nas će ipak biti najvažnije binarne relacije.

Uvedimo sada još nekoliko pojmove vezanih uz relacije.

DEFINICIJA. Neka je $R \subseteq A \times B$ neprazna relacija. *Suprotna (inverzna)* relacija relacijsi R je relacija $R^{-1} \subseteq B \times A$ definirana s

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

DEFINICIJA. Neka je $R \subseteq A \times B$. *Komplement* relacije R je relacija $R^c \subseteq A \times B$ definirana s

$$R^c = \{(a, b) \in A \times B : (a, b) \notin R\}.$$

DEFINICIJA. Neka su A, B, C neprazni skupovi, te $R \subseteq A \times B$ i $S \subseteq B \times C$. *Kompozicija relacija* R i S je relacija $S \circ R \subseteq A \times C$ definirana s

$$S \circ R = \{(a, c) : (\exists b \in B) (aRb \wedge bSc)\}.$$

PRIMJER. Neka je $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$ i $C = \{x, y\}$. Definirajmo relacije $R \subseteq A \times B$ i $S \subseteq B \times C$ s

$$\begin{aligned} R &= \{(1, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}, \\ S &= \{(a, y), (b, x)\}. \end{aligned}$$

Lako se vidi da je npr.

$$\begin{aligned} R^{-1} &= \{(a, 1), (b, 2), (a, 3), (b, 3)\}, \\ S^c &= \{(a, x), (b, y)\}, \\ S \circ R &= \{(1, y), (2, x), (3, x), (3, y)\}. \end{aligned}$$

PRIMJER. Neka je $A = \{1, 2, 3\}$. Definirajmo homogene relacije R i S na skupu A s

$$\begin{aligned}R &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}, \\S &= \{(1, 2), (2, 3)\}.\end{aligned}$$

Vrijedi

$$\begin{aligned}S \circ R &= \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}, \\R \circ S &= \{(1, 2), (2, 1), (2, 2)\},\end{aligned}$$

pa je očito da kompozicija relacija općenito nije komutativna.

TEOREM. Neka su A, B, C, D neprazni skupovi, te $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ i $Z \subseteq C \times D$. Vrijedi

$$Z \circ (S \circ R) = (Z \circ S) \circ R.$$

Prethodni teorem nam u stvari kaže da je kompozicija relacija asocijativna. Stoga za homogenu relaciju R na skupu A ima smisla definirati potencije relacije R na sljedeći način:

$$\begin{aligned} R^0 &= I_A, \\ R^1 &= R, \\ R^2 &= R \circ R, \\ &\vdots \\ R^{n+1} &= R^n \circ R, \quad n > 1. \end{aligned}$$

PROPOZICIJA. Neka je $R \subseteq A \times B$. Vrijedi:

$$R \circ I_A = R, \quad I_B \circ R = R.$$

NAPOMENA. Posebno, ako je $R \subseteq A \times A$, iz prethodne propozicije slijedi

$$R \circ I_A = I_A \circ R = R. \tag{1}$$

Štoviše, I_A je jedina relacija na A sa svojstvom da je za svaku relaciju $R \subseteq A \times A$ ispunjeno (1). Naime, ako bi za neku relaciju Q na A vrijedilo to isto, onda bismo posebno za $R = I_A$ imali

$$I_A \circ Q = Q \circ I_A = I_A. \tag{2}$$

No iz (1) za $R = Q$ i (2) sada slijedi

$$I_A = Q.$$

LEMA. Neka su A i B neprazni skupovi, te $R, S \subseteq A \times B$. Vrijedi:

1. $R \subseteq S \Rightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$,
2. $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$,
3. $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$,
4. $(R^{-1})^{-1} = R$.

Dokaz sami za vježbu.

Homogene relacije mogu imati neka posebna svojstva koja su dana u sljedećoj definiciji.

DEFINICIJA. Neka je R homogena relacija na skupu A . Kažemo da je relacija R :

a) *refleksivna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (x, x) \in R,$$

b) *irefleksivna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (x, x) \notin R,$$

c) *simetrična* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall y \in A) ((x, y) \in R \longrightarrow (y, x) \in R),$$

d) *antisimetrična* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall y \in A) ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \longrightarrow x = y),$$

e) *tranzitivna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall y \in A) (\forall z \in A) ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \longrightarrow (x, z) \in R).$$

Geometrijski gledano, refleksivna relacija sadrži dijagonalu I_A skupa A , irefleksivna relacija ne siječe dijagonalu I_A , a simetrična relacija je simetrična s obzirom na dijagonalu I_A .

Gornja svojstva homogenih relacija se skupovno mogu opisati na sljedeći način.

LEMA. Neka je R relacija na skupu A . Vrijedi:

1. R je *refleksivna* ako i samo ako je $I_A \subseteq R$;
2. R je *irefleksivna* ako i samo ako je $R \cap I_A = \emptyset$;
3. R je *simetrična* ako i samo ako je $R \subseteq R^{-1}$;
4. R je *antisimetrična* ako i samo ako je $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$;
5. R je *tranzitivna* ako i samo ako je $R \circ R \subseteq R$.

NAPOMENA. Uočimo da iz $R \subseteq R^{-1}$ po Lemi slijedi $R^{-1} \subseteq (R^{-1})^{-1} = R$, pa iz te dvije inkluzije zaključujemo da je $R = R^{-1}$. Dakle, može se reći da je relacija R simetrična ako i samo ako je $R = R^{-1}$.

Sada ćemo navesti neka svojstva koja mogu imati heterogene relacije (naravno, mogu ih imati i homogene relacije kao poseban slučaj heterogenih relacija).

DEFINICIJA. Neka su A i B skupovi, te $R \subseteq A \times B$. Kažemo da je relacija R :

a) *injektivna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall x' \in A) (\forall y \in B) ((x, y) \in R \wedge (x', y) \in R \longrightarrow x = x') ;$$

b) *funkcionalna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall y \in B) (\forall y' \in B) ((x, y) \in R \wedge (x, y') \in R \longrightarrow y = y') ;$$

c) *surjektivna* ako vrijedi

$$(\forall y \in B) (\exists x \in A) (x, y) \in R;$$

d) *totalna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\exists y \in B) (x, y) \in R.$$

LEMA. Neka su A i B skupovi, te $R \subseteq A \times B$. Vrijedi:

1. R je injektivna ako i samo ako je $R^{-1} \circ R \subseteq I_A$;
2. R je funkcionalna ako i samo ako je $R \circ R^{-1} \subseteq I_B$;
3. R je surjektivna ako i samo ako je $R \circ R^{-1} \supseteq I_B$;
4. R je totalna ako i samo ako je $R^{-1} \circ R \supseteq I_A$.

DEFINICIJA. Funkcionalne relacije nazivamo *parcijalnim funkcijama*. Totalne funkcionalne relacije nazivamo *funkcijama*.

16 Relacije ekvivalencije

DEFINICIJA. Homogenu binarnu relaciju koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna nazivamo *relacijom ekvivalencije*.

Ovakve relacije igraju vrlo važnu ulogu u matematici i imaju mnoga lijepa svojstva. Relaciju ekvivalencije često označavamo simbolim \sim ili \cong . Ako je $x \sim y$, onda kažemo da je x ekvivalentan s y . Važan primjer relacije ekvivalencije je relacija $=$ ("biti jednak"). Neka je $A \neq \emptyset$ proizvoljan skup i \sim relacija ekvivalencije na njemu. Svakom elementu skupa A možemo pridružiti skup

$$[a] = \{x \in A : x \sim a\},$$

tj. podskup $[a]$ svih onih elemenata skupa A koji su u relaciji \sim s a . Skup $[a]$ zovemo *klasom ekvivalencije* određenom elementom a , a sam element a nazivamo *reprezentantom klase* $[a]$. Budući da je $(\forall a \in A) a \sim a$, to je $(\forall a \in A) [a] \neq \emptyset$.

Pogledajmo još neka važna svojstva klase ekvivalencije.

TEOREM. Neka je $A \neq \emptyset$ proizvoljan skup, \sim relacija ekvivalencije na A , te $x, y \in A$.

1. Ako $x \not\sim y$, onda je $[x] \cap [y] = \emptyset$;
2. Ako je $x \sim y$, onda je $[x] = [y]$.

Sakupimo li u jedan skup sve te različite klase koje definira relacija \sim na skupu A , dobit ćemo skup čiji su elementi neprazni, po parovima disjunktni podskupovi skupa A , a čija je unija jednaka čitavom skupu A . Prema tomu, dobit ćemo jednu *particiju* skupa A . Tu particiju nazivamo *kvocijentnim skupom* skupa A po relaciji \sim i označavamo je s A/\sim .

Dakle, svaka relacija ekvivalencije na skupu A definira jednu particiju skupa A na klase ekvivalencije. No kao što ćemo vidjeti, vrijedi i obrat. No prije nego to dokažemo uvest ćemo funkciju koja elementima skupa pridružuje njima pripadne klase po nekoj relaciji ekvivalencije.

PROPOZICIJA. Neka je \sim relacija ekvivalencije na skupu A i relacija τ na $A \times (A/\sim)$ definirana sa

$$(a, [x]) \in \tau \quad \text{ako i samo ako} \quad a \in [x].$$

Relacija τ je funkcionalna, totalna i surjektivna.

DEFINICIJA. Neka je \sim relacija ekvivalencije na skupu A . Funkcija $\tau : A \rightarrow A/\sim$ definirana izrazom

$$\tau(a) = [a]$$

zove se *projekcija* skupa A na kvocijentni skup A/\sim .

TEOREM. Svaka relacija ekvivalencije na skupu A definira jednu particiju skupa A . U istom elementu particije nalaze se oni i samo oni elementi skupa A koji su međusobno ekvivalentni.

TEOREM. Neka je \mathcal{F} jedna particija skupa A . Tada je relacija $R_{\mathcal{F}}$ na skupu A definirana s

$$(x, y) \in R_{\mathcal{F}} \text{ ako i samo ako } (\exists S \in \mathcal{F}) (x \in S \wedge y \in S)$$

relacija ekvivalencije na A .

PRIMJER. Neka je \mathcal{P} skup svih pravaca neke ravnine. Na skupu \mathcal{P} definiramo relaciju \parallel ("biti paralelan"). Podsjetimo se da su dva pravca u ravnini paralelna ako nemaju nijednu zajedničku točku ili ako se podudaraju. Očito je \parallel relacija ekvivalencije na \mathcal{P} (provjerite sami!). Klase ekvivalencije nazivamo *smjerovima u ravnini*.

Da li je relacija \perp ("biti okomit") relacija ekvivalencije na \mathcal{P} ? (Nije!)

PRIMJER. Neka je \mathcal{T} skup svih trokuta u nekoj ravnini. Relacije \sim ("biti sličan"), \cong ("biti sukladan") i ρ ("imati istu površinu") su relacije ekvivalencije na \mathcal{T} .

PRIMJER. Neka je E^3 prostor. *Orijentirana dužina* u E^3 je svaki uređeni par točaka $(A, B) \in E^3 \times E^3$. Oznaka za orijentiranu dužinu je $(A, B) = \overrightarrow{AB}$. Označimo sa \mathcal{O} skup svih orijentiranih dužina u E^3 , tj.

$$\mathcal{O} = \left\{ \overrightarrow{AB} : A, B \in E^3 \right\} = E^3 \times E^3.$$

Na skupu \mathcal{O} definiramo relaciju \equiv (biti ekvivalentan) na sljedeći način: reći ćemo da je orijentirana dužina \overrightarrow{AB} ekvivalentna orijentiranoj dužini \overrightarrow{CD} , i pist ćemo $\overrightarrow{AB} \equiv \overrightarrow{CD}$ ako i samo ako dužine \overrightarrow{AD} i \overrightarrow{BC} imaju zajedničko polovište-

Provjerite sami da je relacija \equiv relacija ekvivalencije na \mathcal{O} . Kvocijentni skup \mathcal{O}/\equiv označavamo kao V^3 , a njegove elemente (klase ekvivalencije) nazivamo *vektorima*.

17 Relacije uređaja

Osim relacija ekvivalencije s kojima smo se upoznali u prethodnoj točki, važan je još jedan tip binarnih homogenih relacija.

DEFINICIJA. Homogenu binarnu relaciju koja je refleksivna, antisimetrična i tranzitivna nazivamo relacijom *djelomičnog (parcijalnog) uređaja*.

DEFINICIJA. Uređeni par (A, ρ) sastavljen od skupa A i relacije djelomičnog uređaja ρ na skupu A zove se *djelomično (parcijalno) uređen skup*.

Za relacije djelomičnog uređaja često se umjesto $(x, y) \in \rho$ piše $x\rho y$.

PRIMJER. Definirajmo relaciju ρ na skupu \mathbb{N} sa

$$(x, y) \in \rho \text{ ako i samo ako } x \text{ dijeli } y.$$

Očito je ova relacija refleksivna, antisimetrična i tranzitivna, pa je (\mathbb{N}, ρ) djelomično uređen skup. Ipak, nisu svi elementi skupa \mathbb{N} "usporedivi". Npr. $(2, 5) \notin \rho$ i također $(5, 2) \notin \rho$.

Gornji primjer nas motivira za sljedeću definiciju.

DEFINICIJA. Neka je ρ relacija djelomičnog uređaja na skupu A . Ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall y \in A) ((x, y) \in \rho \vee (y, x) \in \rho),$$

onda kažemo da je ρ relacija *linearnog (totalnog) uređaja* na skupu A .

Uređeni par (A, ρ) u tom slučaju nazivamo *linearno (totalno) uređenim skupom* ili jednostavno *uređenim skupom*.

Dva poznata primjera (djelomično) uređenih skupova su (\mathbb{R}, \leq) i $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$, gdje je S neki neprazan skup. Relaciju \subseteq nazivamo *relacijom sadržavanja*.

Djelomično uređene skupove se često prikazuje shematski.

Radi jasnoće ćemo nadalje za relaciju djelomičnog uređaja koristiti oznaku \preceq , a koju ne treba miješati s oznakom \leq koju koristimo za relaciju uređaja "manje ili jednako" na skupovima brojeva.

DEFINICIJA. Neka je (A, \preceq) djelomično uređen skup, te $X \subseteq A$. Kažemo da je $m \in X$ *najmanji element* u skupu X ako vrijedi

$$(\forall x \in X) m \preceq x.$$

Kažemo da je $m \in X$ *minimalni element* u skupu X ako vrijedi

$$(\forall x \in X) (x \preceq m \longrightarrow x = m).$$

Kažemo da je $n \in X$ *najveći element* u skupu X ako vrijedi

$$(\forall x \in X) x \preceq n.$$

Kažemo da je $n \in X$ *maksimalni element* u skupu X ako vrijedi

$$(\forall x \in X) (n \preceq x \longrightarrow x = n).$$

Očigledno je da je najmanji element ujedno i minimalan, a najveći element ujedno i maksimalan. Obrat, međutim, ne mora vrijediti.

Također, djelomično uređen skup može imati više minimalnih i maksimalnih elemenata, a ne mora imati ni najveći ni najmanji element.

PRIMJER. Neka je $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, te neka je relacija \preceq na skupu A dana kao

$$\begin{aligned}\preceq = & \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, c), \\ & (c, b), (c, d), (a, b), (a, d), (e, f)\}.\end{aligned}$$

Elementi a i e su minimalni, a elementi b, d i f su maksimalni po \preceq . No u A nema po \preceq ni najmanjeg ni najvećeg elementa.

PRIMJER. Neka je $A = \{a, b, c, d, e\}$, te neka je relacija \preceq na skupu A dana kao

$$\begin{aligned}\preceq = & \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), \\ & (c, b), (c, d), (a, b), (a, d), (b, e), (d, e), (a, e), (c, e)\}.\end{aligned}$$

Element a je minimalan i najmanji, a element e maksimalan i najveći po \preceq .

DEFINICIJA. Neka je (A, \preceq) djelomično uređen skup, te $X \subseteq A$. Element d skupa A je *donja međa* skupa X u A ako je za svaki $x \in X$ ispunjeno $d \preceq x$. Najveća donja međa, ako postoji, zove se *infimum* skupa X i označava $\inf X$.

Element g skupa A je *gornja međa* skupa X u A ako je za svaki $x \in X$ ispunjeno $x \preceq g$. Najmanja gornja međa, ako postoji, zove se *supremum* skupa X i označava $\sup X$.

Na primjer, u uređaju (\mathbb{N}, \leq) je $\inf \mathbb{N} = 1$, a $\sup \mathbb{N}$ ne postoji. U djelomičnom uređaju $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ je $\inf \mathcal{P}(S) = \emptyset$, a $\sup \mathcal{P}(S) = S$.

Podsjetimo se da smo kod uspoređivanja brojeva često koristili relaciju $<$. Općenito su takve relacije definirane na sljedeći način.

DEFINICIJA. Homogenu binarnu relaciju koja je irefleksivna i tranzitivna nazivamo relacijom *strogog djelomičnog (parcijalnog) uređaja*.

DEFINICIJA. Neka je \prec relacija strogog djelomičnog uređaja na skupu A . Ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall y \in A) [x \neq y \longrightarrow ((x, y) \in \rho \vee (y, x) \in \rho)]$$

onda kažemo da je \prec relacija *strogog uređaja* na skupu A . Uređeni par (A, \prec) u tom slučaju nazivamo *strogo uređenim skupom*.

18 Funkcije

Već smo rekli da su *funkcije* posebne relacije, tj. binarne relacije koje su funkcionalne i totalne. No kako su funkcije same po sebi važan matematički pojam posvetit ćemo im posebnu točku. Pogledajmo najprije jedan primjer.

PRIMJER. Neka je H skup svih državljana Republike Hrvatske. Označimo $Z = \{0, 1, \dots, 9\}$ (skup znamenki dekadskog sustava) i $J = \{(a_1, \dots, a_{13}) : a_1, \dots, a_{13} \in Z\}$ (skup svih trinaesteroznamenkastih brojeva sa znamenkama iz Z). Elemente skupa J možemo interpretirati kao JMBG-ove državljana RH.

Definiramo relaciju $f \subseteq H \times J$ ovako

$$(x, a) \in f \text{ ako i samo ako je } a \text{ JMBG osobe } x.$$

Znamo da svakom državljaninu RH pripada jedinstveni JMBG, pa je ova relacija funkcionalna i totalna. Točnije, f je funkcija.

Napomenimo da se često funkcije definira kao uređene trojke (A, B, f) , gdje su A i B neprazni skupovi, a f pravilo pridruživanja po kojemu se svakom elementu skupa A pridružuje jedan i samo jedan element skupa B . Mi nećemo koristiti takvu definiciju da bismo izbjegli uvođenje pojma "pravila pridruživanja" koji intuitivno nije jasan.

No koristit ćemo uobičajene oznake: za funkciju f umjesto $f \subseteq A \times B$ pisat ćemo $f : A \rightarrow B$, a umjesto $(x, y) \in f$ pisat ćemo $y = f(x)$. Element x nazivamo *argumentom* (neovisnom varijablom), a element y *slikom* ili vrijednošću funkcije (ovisnom varijablom).

Funkcije se često prikazuju *dijagramima*.

DEFINICIJA. Neka je $f : A \rightarrow B$ funkcija i $C \subseteq A$, $D \subseteq B$.

a) *Slika* podskupa C u odnosu na funkciju f je skup

$$f(C) = \{f(x) : x \in C\} \subseteq B,$$

b) *Praslika* podskupa D u odnosu na funkciju f je skup

$$f^{-1}(D) = \{x \in A : f(x) \in D\} \subseteq A.$$

Očito je

$$\begin{aligned} f(A) &\subseteq B, & f^{-1}(B) &= A, \\ f(\emptyset) &= \emptyset, & f^{-1}(\emptyset) &= \emptyset. \end{aligned}$$

Napomenimo da kada se radi o jednočlanim podskupovima ne pišemo vitičaste zgrade, već jednostavno stavljamo

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : f(x) = y\}.$$

PRIMJER. Neka je funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ za sve $x \in \mathbb{R}$ definirana formulom $f(x) = 7$. Vrijedi:

$$K(f) = \{7\}, \quad f([1, 2]) = \{7\}, \quad f^{-1}(\mathbb{R}) = f^{-1}(7) = \mathbb{R},$$

$$f^{-1}([1, 4]) = \emptyset, \quad f^{-1}([3, 8]) = \mathbb{R}, \quad f^{-1}(\{6, 7\}) = \mathbb{R}.$$

PRIMJER. Neka je funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ za sve $x \in \mathbb{R}$ definirana formulom $f(x) = x^2$.

Vrijedi:

$$K(f) = [0, \infty), \quad f([1, 2]) = [1, 4], \quad f^{-1}(\mathbb{R}) = f^{-1}([0, \infty)) = \mathbb{R},$$

$$f^{-1}(4) = \{-2, 2\}, \quad f^{-1}([2, 4]) = [-2, \sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2], \quad f^{-1}(-1) = \emptyset.$$

PROPOZICIJA. Neka je $f : A \rightarrow B$ dana funkcija, te $X, Y \subseteq A$. Vrijedi:

1. $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$,
2. $f(X \cap Y) \subseteq f(X) \cap f(Y)$.

PROPOZICIJA. Neka je $f : A \rightarrow B$ dana funkcija, te $X, Y \subseteq B$. Vrijedi:

1. $f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$,
2. $f^{-1}(X \cap Y) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y)$,
3. $f^{-1}(X \setminus Y) = f^{-1}(X) \setminus f^{-1}(Y)$.

Iz prethodne dvije propozicije vidimo da se praslike ponašaju bolje nego slike.

Krene li se od definicije funkcije kao uređene trojke, graf funkcije $f : A \rightarrow B$ se definira kao skup

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B.$$

No vidimo da se u okviru naše definicije funkcije kao posebne relacije graf funkcije f i sama funkcija f poklapaju, pa nećemo posebno definirati graf funkcije. Točnije, kao što bilo koju relaciju možemo prikazati grafički, tako to možemo napraviti i kada je riječ o funkciji.

PRIMJER. Nacrtaj funkcije $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirane formulama $f(x) = 2x$ odnosno $g(x) = x^2$ za sve $x \in \mathbb{R}$.

DEFINICIJA. Neka su A, B, C proizvoljni skupovi takvi da je $C \subseteq A$. Kažemo da je funkcija $g : C \rightarrow B$ *restrikcija* ili *ograničenje* funkcije $f : A \rightarrow B$ (odnosno da je funkcija f *ekstenzija* ili *proširenje* funkcije g) ako je $g \subset f$. Pišemo $g = f|_C$.

NAPOMENA. Može se pokazati da je $g \subset f$ ako i samo ako je $D(g) \subset D(f)$ i $(\forall x \in D(g)) g(x) = f(x)$.

PRIMJER. Neka je funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $f(x) = |x|$ za sve $x \in \mathbb{R}$, te neka je funkcija $g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $g(x) = x$ za sve $x \in \mathbb{R}_0^+$. Tada je $g = f|_{\mathbb{R}_0^+}$.

PRIMJER. Neka je funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $f(x) = \sqrt{x^2}$ za sve $x \in \mathbb{R}$, te neka je funkcija $g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $g(x) = x$ za sve $x \in \mathbb{R}_0^+$. Tada je $g = f|_{\mathbb{R}_0^+}$.

PRIMJER. Neka je funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $f(x) = \sqrt{1 - \sin^2 x} = |\cos x|$ za sve $x \in \mathbb{R}$, te neka je funkcija $g : [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $g(x) = -\cos x$ za sve $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. Tada je $g = f|_{[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]}$.

Uočimo da je restrikcija neke funkcije na zadani skup jedinstveno određena, dok to nije slučaj kada je riječ o proširenju. Pogledajmo jedan primjer.

PRIMJER. Neka je funkcija $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ za sve $x \in [0, 1]$, te neka je funkcija $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom

$$g(x) = \begin{cases} x + 1, & x \in [-1, 0) \\ \sqrt{1 - x^2}, & x \in [0, 1] \end{cases}$$

za sve $x \in [-1, 1]$. Tada je $f = g|_{[0,1]}$. No funkcija $h : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom

$$h(x) = g(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 0) \\ \sqrt{1 - x^2}, & x \in [0, 1] \end{cases}$$

za sve $x \in [-1, 1]$ je također proširenje funkcije f , tj. $f = h|_{[0,1]}$.

Već smo definirali kompoziciju relacija i pokazali da je ona asocijativna. No sada ćemo dokazati da je kompozicija dviju funkcija funkcija.

TEOREM. Neka su dane funkcije $f : A \rightarrow B$ i $g : B \rightarrow C$. Tada je i $g \circ f$ funkcija, te $g \circ f : A \rightarrow C$.

NAPOMENA. Iz dokaza prethodnog teorema se vidi da se analogna tvrdnja može izreći i za parcijalne funkcije.

NAPOMENA. Posljedica prethodnog teorema jest da je za sve $x \in D(f)$ ispunjeno

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Među funkcijama važnu ulogu igraju one koje su injektivne i surjektivne, tj. injekcije i surjekcije. Podsjetimo se da je funkcija $f : A \rightarrow B$ *injektivna* ako vrijedi

$$(\forall x \in A) (\forall x' \in A) (\forall y \in B) (f(x) = y \wedge f(x') = y \longrightarrow x = x') ,$$

te da je *surjektivna* ako vrijedi

$$(\forall y \in B) (\exists x \in A) f(x) = y.$$

Mogli bismo to izreći i ovako: funkcija $f : A \rightarrow B$ je *injektivna* ako vrijedi

$$(\forall y \in K(f)) (\exists x \in A) f^{-1}(y) = \{x\} ,$$

a *surjektivna* ako vrijedi

$$K(f) = B.$$

PRIMJER. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ definirana izrazom $f(x) = |x|$ za sve $x \in \mathbb{R}$ je surjektivna, ali nije injektivna (npr. $f(-1) = f(1)$). Funkcija $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $g(x) = 2x + 2$ za sve $x \in \mathbb{R}$ je injektivna i surjektivna.

DEFINICIJA. Funkcija je *bijekcija* ako je injekcija i surjekcija.

Posebno, homogenu bijekciju $f : A \rightarrow A$ nazivamo *permutacijom* skupa A .

PRIMJER. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom $f(x) = x^3$ za sve $x \in \mathbb{R}$ je bijekcija. Funkcija $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definirana izrazom $g(x) = \sqrt{1 - x^2}$ za sve $x \in \mathbb{R}$ je također bijekcija.

NAPOMENA. Posebno važna bijekcija koju ćemo često spominjati je tzv. *identiteta* na skupu A , tj. funkcija $i_A : A \rightarrow A$ definirana izrazom $i_A(x) = x$ za sve $x \in A$. Svojstva ove funkcije ispitana su još kada je bila općenito riječ o relacijama, pa znamo da je za svaku funkciju $f : A \rightarrow B$ ispunjeno

$$f \circ id_A = id_B \circ f = f.$$

VJEŽBA. Dokaži da je:

1. kompozicija dviju injekcija injekcija,
2. kompozicija dviju surjekcija surjekcija,
3. kompozicija dviju bijekcija bijekcija.

Sljedeći teorem će nam omogučiti da uvedemo pojam inverzne funkcije.

TEOREM. Neka je dana funkcija $f : A \rightarrow B$. f^{-1} je funkcija ako i samo ako je f bijekcija. Štoviše, f^{-1} je i sama bijekcija.

NAPOMENA. Iz dokaza prethodnog teorema se vidi da je f^{-1} parcijalna funkcija ako i samo ako je f injekcija.

TEOREM. Neka je $f : A \rightarrow B$ bijekcija. Vrijedi

$$f^{-1} \circ f = i_A, \quad f \circ f^{-1} = i_B ,$$

i f^{-1} je jedina funkcija s ovim svojstvima.

NAPOMENA. Posljedica prethodnog teorema jest da je za sve $x \in D(f)$, $y \in K(f)$ ispunjeno

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad (f \circ f^{-1})(y) = y.$$

KOROLAR. Neka je $f : A \rightarrow B$ bijekcija. Vrijedi

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

19 Skup prirodnih brojeva

19.1 Uvod

S prirodnim brojevima se upoznajemo već u osnovnoj školi, no naše znanje o njima tada nije podvrgnuto kritici: šutke prihvaćamo da izvjesna svojstva koja imaju neki prirodni brojevi imaju i svi prirodni brojevi. Tako smo npr. uvjereni da možemo zbrojiti bilo koja dva prirodna broja. Ukoliko smo uopće došli na ideju da promatramo cijeli skup prirodnih brojeva, označimo ga s \mathbb{N} , ipak i dalje vjerujemo da možemo zbrojiti bilo koja dva prirodna broja. No to znači da prešutno prihvaćamo postojanje funkcije "zbrajanja" sa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ u \mathbb{N} . Ovako "eksperimentalno" izgrađen skup \mathbb{N} ima sljedeća svojstva:

1. \mathbb{N} nije prazan.
2. \mathbb{N} je uređen.
3. Ako je $n \in \mathbb{N}$, onda je skup svih prirodnih brojeva manjih od n konačan.
4. Skup \mathbb{N} nema najvećeg elementa.

Ova svojstva imaju za posljedicu funkciju $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, koja elementu $n \in \mathbb{N}$ pridružuje direktnog sljedbenika $s(n) = n + 1$. Pri tomu skup \mathbb{N} , funkcija s i broj 1 imaju jedno važno i ne posve očigledno svojstvo koje se sastoji u sljedećem:

Ako je M podskup skupa \mathbb{N} i ako vrijedi:

1. $1 \in M$,
2. $(\forall x \in \mathbb{N}) (x \in M \longrightarrow s(x) \in M)$,

onda je $M = \mathbb{N}$.

Pokazuje se da je prilikom aksiomatske izgradnje skupa prirodnih brojeva najbolje navedeno svojstvo uzeti kao jedan od aksioma. Evo kako bi izgledala aksiomatska izgradnja skupa \mathbb{N} .

DEFINICIJA. Neprazni skup \mathbb{N} zove se skup prirodnih brojeva, a njegovi elementi prirodni brojevi, ako vrijede sljedeći aksiomi:

A1 Postoji funkcija $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

A2 Postoji barem jedan element u \mathbb{N} , označimo ga s 1, takav da je $(\forall n \in \mathbb{N}) s(n) \neq 1$.

A3 Ako je $s(m) = s(n)$ za $m, n \in \mathbb{N}$, onda je $m = n$.

A4 Ako je M podskup skupa \mathbb{N} i ako vrijedi:

(a) $1 \in M$,

(b) $(\forall x \in \mathbb{N})(x \in M \longrightarrow s(x) \in M)$,

onda je $M = \mathbb{N}$.

Navedeni aksiomi poznati su pod imenom *Peanovi aksiomi skupa prirodnih brojeva*, prema talijanskom matematičaru G. Peanu (1858-1931). U ovoj točki pokazujemo da skup \mathbb{N} , koji zadovoljava navedena četiri aksioma, ima sva ona svojstva za koja vjerujemo da ih ima skup prirodnih brojeva s kojim se služimo u svakodnevnom životu. Time ova definicija dobiva svoje opravdanje, a sva teorija prirodnih brojeva proizlazi iz navedena četiri aksioma i opće sheme logičkog zaključivanja.

Naglasimo da četvrti aksiom ima posebnu ulogu: koristimo ga pri dokazivanju teorema i prilikom rekurzivnog definiranja funkcija na \mathbb{N} .

19.2 Rekurzivna definicija niza

Neka je S neprazan skup, $a \in S$ i $g : S \rightarrow S$. Pomoću funkcije g ćemo definirati funkciju $f : \mathbb{N} \rightarrow S$ na *rekurzivivni* način: najprije broju 1 pridružimo uočeni element $a \in S$, tj. definiramo da je $f(1) = a$. Funkcija g pridružuje elementu a novi element b iz S , a funkcija s broju 1 broj $s(1)$. Sada se pridruže $s(1)$ i b , tj. definiramo da je $f(s(1)) = g(a) = b$. Taj postupak se nastavlja. Recimo da je za neko $n \in \mathbb{N}$ već definirano $f(n) = x$. Funkcija g pridružuje elementu x element $y = g(x)$, a funkcija s broju n broj $s(n)$. Sada se definira $f(s(n)) = g(x) = y$. Naša tvrdnja je da se ovim postupkom stvarno dobiva jedna funkcija sa \mathbb{N} u S i da je ona jedinstvena. Za funkciju f kažemo da je zadana rekurzivno, odnosno da je definirana induktivno. Prilikom takvog definiranja treba uočiti dvoje:

1. kako dobiti $f(1)$ i
2. kako iz $f(n)$ dobiti $f(s(n))$.

TEOREM. (Rekurzivni teorem) Neka je S neprazan skup i a zadani element iz S . Neka je svakom elementu n skupa \mathbb{N} pridružena funkcija $g_n : S \rightarrow S$. Tada postoji jedna i samo jedna funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow S$ takva da je

$$f(1) = a \quad i \quad (\forall n \in \mathbb{N}) f(s(n)) = g_n(f(n)).$$

KOROLAR. Za svaki neprazan skup S , svaki element a iz S i svaku funkciju $g : S \rightarrow S$ postoji jedna i samo jedna funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow S$ takva da je

$$f(1) = a \quad i \quad (\forall n \in \mathbb{N}) f(s(n)) = g(f(n)).$$

DEFINICIJA. Neka je S neprazan skup. Funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow S$ zove se niz.

Ako je $f(n) = a_n$, onda kažemo da je a_n n -ti član niza f . Niz se označava s $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ili jednostavno $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

19.3 Zbrajanje na skupu \mathbb{N}

TEOREM. Postoji jedna i samo jedna funkcija $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sa svojstvima:

1. $(\forall m \in \mathbb{N}) f(m, 1) = s(m)$,
2. $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) f(m, s(n)) = s(f(m, n))$.

DEFINICIJA. Funkcija $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ za koju vrijedi

- a) $(\forall m \in \mathbb{N}) f(m, 1) = s(m)$,
- b) $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) f(m, s(n)) = s(f(m, n))$,

zove se zbrajanje na skupu \mathbb{N} i umjesto $f(m, n)$ pišemo $m + n$. Brojeve m i n nazivamo pribrojnicima, a broj $m + n$ zbrojem.

Posebno, $(\forall m \in \mathbb{N}) f(m, 1) = m + 1 = s(m)$.

TEOREM. (Asocijativnost zbrajanja) Za proizvoljne brojeve $m, n, p \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$(m + n) + p = m + (n + p).$$

TEOREM. (Komutativnost zbrajanja) Za proizvoljne $m, n \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$m + n = n + m.$$

NAPOMENA. Pišemo $s(1) = 2, s(2) = 3, s(3) = 4, \dots$

TEOREM. $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) m + n \neq n.$

NAPOMENA. Uočimo da $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) m + n \neq n$ zbog komutativnosti zbrajanja na \mathbb{N} zanči i $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) m + n \neq m.$

19.4 Množenje na skupu \mathbb{N}

Sada ćemo ponoviti sličan postupak kao u prethodnoj podtočki, ali za množenje prirodnih brojeva.

TEOREM. Postoji jedna i samo jedna funkcija $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sa svojstvima:

1. $(\forall m \in \mathbb{N}) h(m, 1) = m,$
2. $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) h(m, s(n)) = h(m, n) + m.$

DEFINICIJA. Funkcija $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ za koju vrijedi

- a) $(\forall m \in \mathbb{N}) h(m, 1) = m,$
- b) $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) h(m, s(n)) = h(m, n) + m,$

zove se množenje na skupu \mathbb{N} i umjesto $h(m, n)$ pišemo mn . Nadalje, umjesto $h(m, n) + p = f(h(m, n), p)$ pišemo $mn + p$.

Uočimo da $mn + p$ označava superpoziciju dviju funkcija od kojih najprije treba izvršiti množenje. Zato se obično kaže da je množenje operacija višeg reda od zbrajanja.

TEOREM. (Teorem o distributivnosti) Za proizvoljne $m, n, p \in \mathbb{N}$ vrijedi

1. $m(n + p) = mn + mp$,
2. $(m + n)p = mp + np$.

Zbrajanje i množenje su dvije algebarske operacije na skupu \mathbb{N} . Prethodnim teoremom uspostavljena je veza među njima: lijevi i desni zakon distribucije.

TEOREM. (Asocijativnost množenja) Za proizvoljne $m, n, p \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$m(np) = (mn)p.$$

TEOREM. (Komutativnost množenja) Za proizvoljne $m, n \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$mn = nm.$$

U umnošku mn brojeve m i n nazivamo faktorima: m je prvi faktor, a n je drugi faktor. Uočimo da se zbog simetričnosti relacije "jednako" može pisati

$$\begin{aligned} mn + mp &= m(n + p), \\ mp + np &= (m + n)p, \end{aligned}$$

i tada govorimo o izlučivanju zajedničkog faktora p . Tim svojstvima zbrajanja i množenja se često koristimo pri rješavanju konkretnih problema.

19.5 Daljnja svojstva skupa \mathbb{N}

Uvedimo najprije nekoliko pojmove vezanih općenito uz skupove.

DEFINICIJA. Za dva skupa S i S' kažemo da su ekvipotentni, u oznaci $S \cong S'$, ako postoji barem jedna bijekcija sa S na S' .

Lako se vidi da je relacija ekvipotencije jedna relacija ekvivalencije na klasi svih skupova, pa se skupovi mogu svrstati u međusobno disjunktne klase ekvivalencije s obzirom na ovu relaciju. Klasu kojoj neki skup S pripada nazivamo njegovim *kardinalnim brojem* i označavamo s $\text{kard}(S)$.

DEFINICIJA. Reći ćemo da je skup S beskonačan ako postoji pravi podskup $S' \subset S$ takav da je $S \cong S'$. Ako skup nije beskonačan, onda kažemo da je konačan.

DEFINICIJA. Neka je S konačan skup. Reći ćemo da je n broj elemenata skupa S i pisati $\text{kard}(S) = n$ ako je $S \cong \{1, 2, \dots, n\} \subset \mathbb{N}$.

Sada ćemo vidjeti kakva je priroda kardinalnog broja skupa \mathbb{N} .

LEMA. Ako je $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, onda postoji barem jedan $m \in \mathbb{N}$ takav da je $n = s(m)$. Drugim riječima, s je preslikavanje sa \mathbb{N} na $\mathbb{N} \setminus \{1\}$.

KOROLAR. Skup \mathbb{N} je beskonačan.

Posebno, kardinalni broj $\text{kard}(\mathbb{N})$ skupa prirodnih brojeva označavamo s \aleph_0 (čitamo *alef-nula*).

DEFINICIJA. Reći ćemo da je skup S prebrojiv ako je ekvipotentan skupu \mathbb{N} .

NAPOMENA. Lako se vidi da je svaki beskonačan podskup skupa \mathbb{N} ekvipotentan skupu \mathbb{N} , te da je svaki podskup prebrojivog skupa konačan ili prebrojiv. No možda je manje očigledno da je npr. prebrojiv i skup $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Štoviše, takav je svaki skup \mathbb{N}^k , gdje je k neki prirodan broj. Može se također pokazati da je unija konačnog broja prebrojivih ili konačnih skupova prebrojiv ili konačan skup.

Sljedećim dvama teoremmi zbog duljine preskačemo dokaz.

TEOREM. Za $m, n \in \mathbb{N}$ vrijedi jedna i samo jedna od sljedećih izreka:

1. $m = n$,
2. $(\exists p \in \mathbb{N}) m + p = n$,
3. $(\exists p \in \mathbb{N}) n + p = m$.

TEOREM. (O regularnosti zbrajanja i množenja prirodnih brojeva) Ako su $m, p, q \in \mathbb{N}$, onda

$$m + p = m + q \Rightarrow p = q,$$

i

$$mp = mq \Rightarrow p = q.$$

19.6 O uređenosti skupa \mathbb{N}

Na osnovi prethodnih Teorema može se na skupu \mathbb{N} uvesti strogi uređaj na sljedeći način: $s <$ označimo onaj podskup skupa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ koji sadrži samo one parove $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ koji imaju svojstvo da postoji neki $p \in \mathbb{N}$ takav da je $m = n + p$. Lako se vidi da je relacija $<$ relacija strogog uređaja na \mathbb{N} , te da je $(\mathbb{N}, <)$ strogog uređen skup.

Naime, relacija $<$ je irefleksivna, jer ako bi za neki $n \in \mathbb{N}$ vrijedilo $(n, n) \in <$, odnosno $n < n$, postojao bi $p \in \mathbb{N}$ takav da je $n = n + p$ što nije moguće. Nadalje, ako je za neke n, m i l ispunjeno $n < m$ i $m < l$, onda postaje p_1 i p_2 u \mathbb{N} takvi da je $m = n + p_1$ i $l = m + p_2$. Iz ovoga slijedi

$$l = (n + p_1) + p_2 = n + (p_1 + p_2) = n + p_3, \quad p_3 \in \mathbb{N},$$

pa je $l < n$, čime je dokazano da je $<$ tranzitivna. I na kraju, po jednom od prethodnih Teorema slijedi i da su svaka dva različita elementa skupa \mathbb{N} usporediva po $<$.

Ova relacija strogog uređaja je na prirodan način povezana s operacijama zbrajanja i množenja na skupu \mathbb{N} :

1. ako je $m = n + p$ i $m' = n' + p'$, onda je

$$m + m' = (n + n') + (p + p'),$$

pa $n < m$ i $n' < m'$ povlači $n + n' < m + m'$;

2. ako je $m = n + p$, onda je

$$mq = (n + p)q = nq + pq, \quad q \in \mathbb{N}$$

pa $n < m$ povlači $nq < mq$ za bilo koji $q \in \mathbb{N}$.

Uvakvo uređenje skupa \mathbb{N} nazivamo *prirodnim uređenjem*. U odnosu na njega postoji najmanji element i to je broj 1, jer za bilo koji $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ postoji $p \in \mathbb{N}$ takav da je $n = s(p)$, tj. $n = p + 1$, pa slijedi $1 < n$.

TEOREM. \mathbb{N} je diskretno uređen skup, tj. za svaki $n \in \mathbb{N}$ postoji jedinstveni element $n' \in \mathbb{N}$ takav da je $n < n'$ i da u \mathbb{N} nema elementa koji je između n i n' . Nadalje, ako je $n > 1$, onda postoji jedinstveni element $n'' \in \mathbb{N}$ takav da je $n'' < n$ i da između n'' i n nema elemenata skupa \mathbb{N} .

TEOREM. Za svaki $n \in \mathbb{N}$ skup

$$L_n = \{m \in \mathbb{N} : m < n + 1\}$$

je konačan.

TEOREM. Skup \mathbb{N} nema najvećeg elementa.

20 Skup cijelih brojeva

20.1 Uvod

Cijeli brojevi se uvode zbog toga što je oduzimanje općenito neizvedivo u skupu prirodnih brojeva. Svaki cijeli broj je oblika $m - n$, gdje su m i n neki prirodni brojevi. Pri tomu za cijele brojeve $m - n$ i $p - q$ vrijedi:

1. $m - n = p - q$ ako i samo ako $m + q = p + n$,
2. $(m - n) + (p - q) = (m + p) - (n + q)$,
3. $(m - n)(p - q) = (mp + nq) - (mq + np)$.

Iz ovoga se vidi da cijele brojeve treba promatrati kao uređene parove prirodnih brojeva, odnosno elemente skupa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Stoga ćemo definirati posebnu relaciju ekvivalencije \sim na skupu $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ i pokazati da skup $\mathbb{N} \times \mathbb{N}/\sim$ ima svojstva skupa cijelih brojeva na koja smo navikli. No čitava konstrukcija se oslanja na sljedeći teorem.

TEOREM. Definiramo relaciju \sim na $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sa

$$(m, n) \sim (p, q) \quad \text{ako i samo ako je } m + q = p + n.$$

Vrijedi:

1. \sim je relacija ekvivalencije na $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$;
2. Iz $(m, n) \sim (m', n')$ i $(p, q) \sim (p', q')$ slijedi

$$\begin{aligned} (m + p, n + q) &\sim (m' + p', n' + q') , \\ (mp + nq, mq + np) &\sim (m'p' + n'q', m'q' + n'p') . \end{aligned}$$

DEFINICIJA. Neka je \sim relacija na $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definirana s

$$(m, n) \sim (p, q) \quad \text{ako i samo ako je } m + q = p + n.$$

Skup $\mathbb{N} \times \mathbb{N}/\sim$ nazivamo skupom cijelih brojeva. Označavamo ga sa \mathbb{Z} , a njegove elemente nazivamo cijelim brojevima.

20.2 Zbrajanje i množenje na \mathbb{Z}

Podsjetimo se da smo sa τ označavali funkciju projekcije vezanu uz neku relaciju ekvivalencije. U našem slučaju ćemo promatrati relaciju ekvivalencije \sim na skupu $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ pomoću koje smo definirali cijele brojeve. Projekcija $\tau : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$ svakom uređenom paru prirodnih brojeva (m, n) pridružuje odgovarajuću klasu ekvivalencije po relaciji \sim , tj. odgovarajući cijeli broj. Može se pokazati (dokaz zbog duljine preskačemo) da za bilo koje $(m, n), (p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ vrijedi:

1. $\tau(m, n) + \tau(p, q) = \tau(m + p, n + q);$
2. $\tau(m, n) \tau(p, q) = \tau(mp + nq, mq + np).$

Dakle, projekcija τ nam omogućava da operacije zbrajanja i množenja, koje smo već definirali na skupu \mathbb{N} , proširimo i na skup \mathbb{Z} . Štoviše, pri tomu se sačuvaju sva ona svojstva zbrajanja i množenja koja smo već opisali u prethodnoj točki (komutativnost, asocijativnost i distributivnost).

Posebno izdvajamo cijeli broj $\tau(1, 1)$. Taj se element označava s 0 i zove se *nula* u \mathbb{Z} . Lako se vidi da vrijedi

$$a + 0 = 0 + a = a$$

za svaki $a \in \mathbb{Z}$ i 0 je jedini element s ovim svojstvom.

No elementi skupa \mathbb{Z} imaju još jedno važno svojstvo koje je opisano u narednom teoremu.

TEOREM. Za svaki $a \in \mathbb{Z}$ postoji jedan i samo jedan $a' \in \mathbb{Z}$ takav da je

$$a + a' = a' + a = 0.$$

Element a' sa svojstvom $a + a' = 0$ nazivamo *suprotnim* ili *inverznim* elementom elementa a , a u dalnjemu ćemo ga označavati s $-a$ (minus a). Dakle, $-a \in \mathbb{Z}$ je po definiciji onaj element za koga vrijedi

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Primijetimo da je $\tau(m, n) = -\tau(n, m)$, što se lako vidi iz dokaza prethodnog teorema. Također, zbog jedinstvenosti suprotnog elementa lako se vidi da je $-(-a) = a$.

Zbroj $b + (-a)$ piše se kao $b - a$ i zove se *razlika* elemenata b i a . Uočimo, također, da za $b = \tau(k, l)$ i $a = \tau(m, n)$ vrijedi

$$\begin{aligned} b - a &= \tau(k, l) + [-\tau(m, n)] = \tau(k, l) + \tau(n, m) = \tau(k + n, l + m) \\ &= -\tau(l + m, k + n) = -[\tau(l, k) + \tau(m, n)] = -(-b + a) = -(a - b), \end{aligned}$$

tj. izmjenimo li poredak prilikom oduzimanja dobit ćemo element suprotan onomu kojega bismo dobili u prvobitnomu poretku.

20.3 O uređenosti skupa \mathbb{Z}

Uređajnu relaciju na skupu \mathbb{Z} uvodimo na osnovi sljedećeg teorema.

TEOREM. $P = \{\mathbb{Z}_-, \mathbb{Z}_0, \mathbb{Z}_+\}$ je jedna particija skupa \mathbb{Z} , pri čemu je

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_+ &= \{\tau(n+1, 1) : n \in \mathbb{N}\}, \\ \mathbb{Z}_- &= \{\tau(1, n+1) : n \in \mathbb{N}\}, \\ \mathbb{Z}_0 &= \{0\}.\end{aligned}$$

Elementi skupa \mathbb{Z}_+ zovu se *strogo pozitivni* cijeli brojevi, a elementi skupa \mathbb{Z}_- *strogo negativni* cijeli brojevi. Iz prethodnog teorema slijedi da je $\{\mathbb{Z}_-, \mathbb{Z}_0, \mathbb{Z}_+\}$ jedna particija skupa \mathbb{Z} .

Također, lako se vidi da iz $a \in \mathbb{Z}_+$ slijedi $-a \in \mathbb{Z}_-$ i obratno.

TEOREM. Skup

$$\rho = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b - a \in \mathbb{Z}_+\}$$

je uređajna relacija na \mathbb{Z} .

Dakle, prethodni teorem nam garantira da je ρ uređajna relacija na \mathbb{Z} . Tu relaciju označavamo s $<$, i za svaka dva cijela a i b broja vrijedi točno jedno od troje: $a = b$, $a < b$ (tj. $(a, b) \in \rho$) ili $b < a$ (tj. $(b, a) \in \rho$). Također, iz $a < b$ i $b < c$ slijedi $a < c$.

Očito je da iz $a \in \mathbb{Z}_+$ slijedi $a > 0$, a iz $a \in \mathbb{Z}_-$ slijedi $a < 0$ i obratno.

TEOREM. Za elemente skupa \mathbb{Z} vrijede sljedeće izreke:

1. $(a > 0 \wedge b > 0) \Rightarrow (a + b > 0)$,
2. $(a > 0 \wedge b > 0) \Rightarrow (ab > 0)$,
3. $(a > 0 \wedge b < 0) \Rightarrow (ab < 0)$,
4. $(a < 0 \wedge b < 0) \Rightarrow (ab > 0)$,
5. $(a < b) \Rightarrow (\forall c \in \mathbb{Z}) (a + c < b + c)$,
6. $a \neq 0 \Rightarrow a^2 = a \cdot a > 0$,
7. $ab = 0 \Rightarrow (a = 0 \vee b = 0)$,
8. $(ab = ac \wedge a \neq 0) \Rightarrow b = c$.

20.4 Ulaganje prirodnih u cijele brojeve

Vidjeli smo iz prethodnog da za svaki $a \in \mathbb{Z}_+$ postoji jedan i samo jedan $n \in \mathbb{N}$ takav da vrijedi $a = \tau(n+1, 1)$. Na taj način je zadan jedan niz $j : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, gdje je $j(n) = \tau(n+1, 1)$. Lako se pokaže da niz j ima ova svojstva:

1. j bijektivno preslikava \mathbb{N} na \mathbb{Z}_+ ,
2. $j(m+n) = \tau(m+n+1, 1) = \tau(m+n+1+1, 1+1)$
 $= \tau(m+1, 1) + \tau(n+1, 1) = j(m) + j(n)$ (j prenosi zbrajanje iz \mathbb{N} u \mathbb{Z}_+),
3. $j(mn) = \tau(mn+1, 1) = \tau(mn+m+n+1+1, m+n+1+1)$
 $= \tau(m+1, 1) \tau(n+1, 1) = j(m) j(n)$ (j prenosi množenje iz \mathbb{N} u \mathbb{Z}_+),
4. $(m < n) \Leftrightarrow (j(m) < j(n))$ (j prenosi uređaj sa \mathbb{N} u uređaj u \mathbb{Z}_+).

Štoviše, može se pokazati da uređena trojka $(\mathbb{Z}_+, s', j(1))$, gdje je $s' : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$ definirana sa $s'(j(n)) = j(n + 1)$, zadovoljava Peanove aksiome A1-A4. Prema tomu, \mathbb{Z}_+ je skup prirodnih brojeva isto toliko koliko je i \mathbb{N} .

Zahvaljujući svojstvima funkcije j možemo na neki način poistovijetiti skupove \mathbb{N} i $\mathbb{Z}_+ = j(\mathbb{N})$: svaki teorem dokazan u \mathbb{N} pomoću j prelazi u teorem u \mathbb{Z}_+ i obratno. Kažemo da smo \mathbb{N} *uložili* u \mathbb{Z} . Koristeći prije spomenutu identifikaciju smatramo da su elementi $n \in \mathbb{N}$ i $j(n) = \tau(n + 1, 1) \in \mathbb{Z}_+$ identični, pa s n označavamo cijeli broj $\tau(n + 1, 1)$. Tako npr. umjesto $\tau(2, 1)$ pišemo 1, umjesto $\tau(3, 1)$ pišemo 2 itd. No također, umjesto $\tau(1, n + 1) = -\tau(n + 1, 1)$ pišemo $-n$ (suprotni broj broju $n \in \mathbb{N}$). Sada lako vidimo da vrijedi

$$(-1)(-1) = \tau(1, 2)\tau(1, 2) = \tau(1 \cdot 1 + 2 \cdot 2, 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1) = \tau(2, 1) = 1,$$

i isto tako

$$(-1)n = \tau(1, 2)\tau(n + 1, 1) = \tau(n + 1 + 2, 1 + 2n + 2) = \tau(1, n + 1) = -n.$$

Dakle, ovako definiran skup \mathbb{Z} ima svojstva skupa cijelih brojeva na koja smo navikli, a strogo je zasnovan.

Vidjeli smo da postoji bijekcija između skupa \mathbb{N} i skupa \mathbb{Z}_+ koji je pravi podskup skupa \mathbb{Z} . Iz toga slijedi da je \mathbb{Z}_+ prebrojiv, a onda posredno i da je \mathbb{Z}_- prebrojiv jer je $\mathbb{Z}_+ \cong \mathbb{Z}_-$. Iz već spomenute činjenice da je unija konačnog broja prebrojivih ili konačnih skupova prebrojiva ili konačna odmah slijedi da je \mathbb{Z} prebrojiv. No pokazat ćemo to direktno ustanovivši jednu bijekciju između skupova \mathbb{N} i \mathbb{Z} . Iz toga će nam slijediti da je $\text{kard}(\mathbb{Z}) = \aleph_0$.

TEOREM. Skup \mathbb{Z} je prebrojiv.

TEOREM. Skup \mathbb{Z} nema ni najmanjeg ni najvećeg elementa.

21 Djeljivost i kongruencije

U ovom poglavlju ćemo se detaljnije pozabaviti dvjema relacijama vezanim uz skup cijelih brojeva \mathbb{Z} , no također i uz skup prirodnih brojeva \mathbb{N} . Te su relacije *djeljivost* i *kongruencija*. Prva je relacija parcijalnog uređaja, dok je druga relacija ekvivalencije.

Matematička disciplina koja, općenito govoreći, proučava svojstva prirodnih brojeva zove se *teorija brojeva*. Njen najstariji dio je *elementarna teorija brojeva*, koja svoje začetke ima još u starohebrejskoj, starogrčkoj i starokineskoj matematici.

21.1 Djeljivost

Temeljni pojam teorije brojeva je *djeljivost*.

DEFINICIJA. Kažemo da broj $a \in \mathbb{N}$ dijeli broj $b \in \mathbb{N}$ ako postoji broj $k \in \mathbb{N}$ takav da je $b = ka$. U tom slučaju pišemo $a | b$. Kažemo još i da je broj b djeljiv brojem a , odnosno da je a djelitelj (divizor) broja b , ili pak da je b višekratnik broja a .

Ukoliko broj $a \in \mathbb{N}$ ne dijeli broj $b \in \mathbb{N}$ pišemo $a \nmid b$.

DEFINICIJA. Prirodne brojeve koji su djeljivi s 2 zovemo parnim brojevima, dok sve ostale zovemo neparnim brojevima.

Očito, skup prirodnih brojeva možemo podijeliti na dva disjunktna podskupa: skup parnih i skup neparnih brojeva.

Djeljivost je, dakle, jedna relacija na skupu \mathbb{N} . Definirana je na sljedeći način:

$$\mid = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a | b\} .$$

Pogledajmo neka važna svojstva ove relacije.

PROPOZICIJA. Vrijedi:

1. $(\forall a \in \mathbb{N}) a \mid a;$
2. $(\forall a \in \mathbb{N}) (\forall b \in \mathbb{N}) (a \mid b \wedge b \mid a \longrightarrow a = b);$
3. $(\forall a \in \mathbb{N}) (\forall b \in \mathbb{N}) (\forall c \in \mathbb{N}) (a \mid b \wedge b \mid c \longrightarrow a \mid c),$

tj. relacija \mid je relacija parcijalnog uređaja na skupu \mathbb{N} .

Djeljivost ima i neka dodatna lijepa svojstva.

PROPOZICIJA. Vrijedi:

1. $(\forall a \in \mathbb{N}) (\forall b \in \mathbb{N}) (\forall c \in \mathbb{N}) (a \mid b \wedge a \mid c \longrightarrow a \mid b + c);$
2. $(\forall a \in \mathbb{N}) (\forall b \in \mathbb{N}) (\forall c \in \mathbb{N}) (a \mid b \longrightarrow a \mid bc).$

Pojam djeljivosti možemo lako proširiti i na cijele brojeve. U tom slučaju jednostavno kažemo da broj $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ dijeli broj $b \in \mathbb{Z}$ ako postoji $k \in \mathbb{Z}$ takav da je $b = ka$.

VJEŽBA. Dokažite da relacija djeljivosti na \mathbb{Z} ima sljedeća svojstva:

1. $(\forall a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) a \mid a;$
2. $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (a \mid b \wedge b \mid a \longrightarrow a = \pm b);$
3. $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (\forall c \in \mathbb{Z}) (a \mid b \wedge b \mid c \longrightarrow a \mid c);$
4. $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (\forall c \in \mathbb{Z}) (a \mid b \wedge a \mid c \longrightarrow a \mid b \pm c);$
5. $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (\forall c \in \mathbb{Z}) (a \mid b \longrightarrow a \mid bc).$

Sično kao u slučaju prirodnih brojeva, postoje i parovi cijelih brojeva koji nisu djeljivi ni u kojem poretku. No i u tom slučaju možemo reći nešto o tim brojevima, a što, to nam govori vrlo važan rezultat elementarne teorije brojeva.

TEOREM. (O dijeljenju s ostatkom) Za svaki $a \in \mathbb{N}$ i svaki $b \in \mathbb{Z}$ postoji jedinstveni brojevi $q, r \in \mathbb{Z}$ takvi da je $0 \leq r < b$ i $b = qa + r$.

Broj q iz ovog teorema zovemo *količnik* (kvocijent), a broj r *ostatak* pri dijeljenju broja b brojem a . Broj a zovemo *djelitelj* (divizor), a broj b *djeljenik* (dividend).

PRIMJER. $25 = 3 \cdot 7 + 4$, $-25 = (-4) \cdot 7 + 3$, ali ne $-25 = (-3) \cdot 7 - 4$.

NAPOMENA. Primijetimo da $a \mid b$ ako i samo ako je ostatak r pri dijeljenju b s a jednak nuli.

Ako su $a, b \in \mathbb{N}$, onda skup S svih prirodnih brojeva koji dijele i a i b nije prazan (sigurno je $1 \in S$). Budući je skup S konačan, to on ima najveći element, označimo ga s $m(a, b)$. Broj $m(a, b)$ nazivamo najvećom zajedničkom mjerom brojeva a i b . Jasno je da vrijedi:

1. $(\forall a \in \mathbb{N}) (\forall b \in \mathbb{N}) m(a, b) = m(b, a);$
2. $(\forall a \in \mathbb{N}) m(a, a) = a;$
3. $(\forall a \in \mathbb{N}) m(1, a) = 1.$

NAPOMENA. Uočimo da je $m(a, b) = m(r, a)$, gdje je r ostatak pri dijeljenju broja b brojem a . Naime, iz $b = qa + r$ slijedi da kada god neki $c \mid a$ i $c \mid b$, onda i $c \mid r$, pa $m(a, b) \mid r$. Iz ovoga slijedi $m(a, b) \mid m(r, a)$. No analogno se dobije i da $m(r, a) \mid m(a, b)$, pa je $m(a, b) = m(r, a)$.

Vrijednost funkcije $m : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ na uređenom paru $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $a < b$, dobiva se tzv. *Euklidovim algoritmom*

$$\begin{aligned} b &= q_1a + r_1, \quad 0 < r_1 < a \\ a &= q_2r_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1 \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= q_{n+1}r_n + r_{n+1}, \quad r_{n+1} = 0. \end{aligned}$$

Očito, kako je $a > r_1 > r_2 > \dots > r_{n+1} \geq 0$ proces završava nakon konačno mnogo koraka, tj. postoji $n \in \mathbb{N}_0$ takav da je $r_{n+1} = 0$ i $r_n > 0$ (pri tom uzimamo da je $r_0 = a$). No tada je $r_{n-1} = q_{n+1}r_n$, pa iz

$$m(a, b) = m(r_1, a) = m(r_2, r_1) = \dots = m(r_n, r_{n-1}) = r_n$$

slijedi

$$m(a, b) = r_n.$$

Iz gornjeg algoritma se odmah dobije da za bilo koje prirodne brojeve a i b postoje cijeli brojevi c i d takvi da je

$$m(a, b) = ac + bd.$$

PRIMJER. Neka je $a = 30$ i $b = 135$. Po Euklidovom algoritmu dobijemo

$$\begin{aligned}135 &= 4 \cdot 30 + 15 \\30 &= 2 \cdot 15 + 0,\end{aligned}$$

pa je

$$m(30, 135) = 15$$

i

$$15 = 1 \cdot 135 + (-4) \cdot 30.$$

PRIMJER. Neka je $a = 42$ i $b = 165$. Po Euklidovom algoritmu dobijemo

$$165 = 3 \cdot 42 + 39$$

$$42 = 1 \cdot 39 + 3$$

$$39 = 13 \cdot 3 + 0,$$

pa je

$$m(42, 165) = 3$$

i

$$\begin{aligned} 3 &= 42 - 1 \cdot 39 = 42 - 1 \cdot (165 - 3 \cdot 42) \\ &= 42 + 3 \cdot 42 - 1 \cdot 165 = 4 \cdot 42 + (-1) \cdot 165. \end{aligned}$$

DEFINICIJA. Kažemo da su prirodni brojevi a i b relativno prosti ako je $m(a, b) = 1$.

VJEŽBA. Dokaži da za prirodne brojeve a, b, c vrijedi:

1. Ako $a \mid b$, onda je $m(a, b) = a$;
2. Ako je $m(a, b) = 1$ i $a \mid bc$, onda $a \mid c$;

21.2 Prosti brojevi

Često se postavlja pitanje koji sve brojevi dijele neki prirodni broj n . Uočimo najprije da je svaki prirodni broj n djeljiv s 1 i sa samim sobom. Iako naoko izgleda lako odrediti sve preostale djelitelje broja n , za velike brojeve n to postaje težak problem.

Među svim prirodnim brojevima posebno se ističu oni koji nemaju drugih djelitelja osim jedinice i samih sebe.

DEFINICIJA. Reći ćemo da je prirodni broj $p > 1$ prost ako je djeljiv samo s 1 i sa samim sobom. Prirodne brojeve veće od 1 koji nisu prosti zovemo složenim brojevima.

Dakle, skup prirodnih brojeva možemo podijeliti na tri međusobno disjunktna podskupa: $\{1\}$, skup P prostih brojeva i skup S složenih brojeva.

Početni dio skupa P izgleda ovako:

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, \dots\}.$$

Uočimo da je 2 najmanji prost broj i ujedno jedini paran prost broj. Svi preostali prosti brojevi su neparni.

Zanimljiv je problem odrediti sve proste brojeve manje ili jednake nekomu zadatom prirodnom broju n . Jednostavnu metodu za to je pronašao starogrčki matematičar Eratosten, pa se ona naziva *Eratostenovo sito*. Postupak je sljedeći: najprije napišemo sve prirodne brojeve manje ili jednake n .

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots, n.$$

Najprije prekrižimo 1. Najmanji prosti broj je $p_1 = 2$, pa prekrižimo sve višekratnike broja 2 iza njega. Najmanji od preostalih brojeva je 3 koji je prost, pa je $p_2 = 3$ (naravno, ako je $n > 2$). Nakon toga prekrižimo sve višekratnike broja 3. ostalo je

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots, n.$$

Postupak za $p_3 = 5$ nastavimo s višekratnicima broja 5 i tako dalje. Na kraju će u nizu preostati samo prosti brojevi.

Uz proste brojeve vezano je mnoštvo problema koje je lako razumjeti, ali teško riješiti. Neki od njih su postavljeni u davnoj prošlosti, a nisu riješeni do dana današnjeg. Jedan od najpoznatijih je tzv. *Goldbachova slutnja*, koju je postavio njemački matematičar Christian Goldbach (1690-1764) u svom pismu Euleru 1742. Ona glasi:

Svaki paran prirodan broj veći od 2 se može prikazati kao zbroj dva prosta broja.

Npr. $4 = 2 + 2$, $6 = 3 + 3$, $8 = 3 + 5$, $10 = 5 + 5$, $12 = 5 + 7$, ...

Na neka pitanja vezana uz proste brojeve ipak znamo odgovoriti. Najvažniji je sljedeći teorem.

TEOREM. (Euklid) Prostih brojeva ima beskonačno mnogo.

Da bismo dokazali ovaj teorem trebat će nam jedna lema.

LEMA. Svaki prirodni broj veći od 1 može se prikazati kao umnožak od jednog ili više prostih brojeva.

Dokazali smo da se svaki prirodni broj veći od 1 može prikazati kao umnožak jednog ili više prostih brojeva, tj. *rastaviti na proste faktore*. U Lemi smo dokazali egzistenciju takvog rastava, no može se pokazati i da je takav rastav jedinstven do na poredak faktora. O tomu govori sljedeći teorem.

TEOREM. (Osnovni teorem aritmetike) Za svaki prirodni broj $n > 1$ postoje jedinstveni prirodni brojevi $k, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ i jedinstveni prosti brojevi $p_1 < \dots < p_k$ takvi da je

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

Rastav opisan u prethodnom teoremu nazivamo *kanonskim rastavom* broja n .

PRIMJER. $18 = 2^1 3^2$, $35 = 5^1 7^1$, $180 = 2^2 3^2 5^1$.

21.3 Kongruencije

Teorem o dijeljenju s ostatkom direktno se nadovezuje na jedan važan primjer relacije ekvivalencije.

DEFINICIJA. Neka su $a, b \in \mathbb{Z}$ i $n \in \mathbb{N}$. Kažemo da je a kongruentno b modulo n i pišemo

$$a \equiv b \pmod{n}$$

ako $n \mid a - b$.

PRIMJER. $17 \equiv 2 \pmod{5}$, $17 \equiv -3 \pmod{5}$, ali nije $12 \equiv 5 \pmod{4}$.

Za neki dani $n \in \mathbb{N}$ ovim je definirana jedna relacija na skupu \mathbb{Z} . Označavamo je s $\equiv \pmod{n}$ i zovemo "kongruencija modulo n ". ovaj pojam je uveo Gauss 1801. godine.

PROPOZICIJA. Neka je dan neki $n \in \mathbb{N}$. Vrijedi:

1. $(\forall a \in \mathbb{Z}) a \equiv a \pmod{n}$;
2. $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (a \equiv b \pmod{n} \longrightarrow b \equiv a \pmod{n})$;
3. $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\forall b \in \mathbb{Z}) (\forall c \in \mathbb{Z}) (a \equiv b \pmod{n} \wedge b \equiv c \pmod{n} \longrightarrow a \equiv c \pmod{n})$.

Drugim riječima, relacija $\equiv \pmod{n}$ je relacija ekvivalencije na skupu \mathbb{Z} .

Kongruencije imaju još neka lijepa svojstva.

PROPOZICIJA. Neka je dan neki $n \in \mathbb{N}$. Ako su $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ takvi da je $a \equiv c \pmod{n}$ i $b \equiv d \pmod{n}$, onda je $a + b \equiv c + d \pmod{n}$ i $ab \equiv cd \pmod{n}$.

PROPOZICIJA. Neka su $d, n \in \mathbb{N}$ relativno prosti brojevi. Tada za bilo koje $a, b \in \mathbb{Z}$ vrijedi $ad \equiv bd \pmod{n}$ ako i samo ako $a \equiv b \pmod{n}$.

22 Skup racionalnih brojeva

22.1 Uvod

U ovoj čemo točki, polazeći od skupa \mathbb{Z} , postupcima sličnima onima koje smo primijenili prilikom izgradnje samog skupa \mathbb{Z} izgraditi skup racionalnih brojeva \mathbb{Q} . Svakako želimo da dobiveni skup ima svojstva na koja smo navikli. Podsjetimo se na neka od njih:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = cb,$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Upravo ovim svojstvima biti će motivirane neke od definicija koje slijede. Tako prvo svojstvo pokazuje da treba promatrati uređene parove iz $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ (sa \mathbb{Z}^* označavamo skup $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$), a da treba "poistovjećivati" parove (a, b) i (c, d) za koje vrijedi $ad = bc$. To nam sugerira da treba definirati odgovarajuću relaciju ekvivalencije na $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

TEOREM. Za dva elementa (a, b) i (c, d) iz $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ definiramo

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{ako i samo ako je } ad = cb.$$

Tada je \sim relacija ekvivalencije na $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Nadalje, ako je

$$(a, b) \sim (a', b') \quad \text{i} \quad (c, d) \sim (c', d') ,$$

onda je

$$(ad + cb, bd) \sim (a'd' + c'b', b'd') ,$$

i

$$(ac, bd) \sim (a'c', b'd') .$$

DEFINICIJA. Neka je \sim relacija ekvivalencije kao u prethodnom teoremu. Skup

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim$$

nazivamo skupom racionalnih brojeva.

Sa τ nadalje označavamo projekciju skupa $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ na skup \mathbb{Q} .

PRIMJER.

$$\tau(1, 2) = [(1, 2)] = \{(1, 2), (-1, -2), (2, 4), (-2, -4), (3, 6), (-3, -6), \dots\}.$$

22.2 Zbrajanje i množenje na \mathbb{Q}

Do relacije ekvivalencije \sim dosli smo zamjenivši $\frac{a}{b}$ s parom (a, b) . Na sličan način, formule $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$ i $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ pređu u $(ad + cb, bd)$ i (ac, bd) . Time smo dobili zbrajanje i množenje na $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Dobivene algebarske operacije spustimo, zatim, pomoću projekcije τ na \mathbb{Q} . Provode se sva razmatranja kao u točki o cijelim brojevima. Tim putem dolazimo do

$$\tau(a, b) + \tau(c, d) = \tau(ad + cb, bd), \quad (3)$$

$$\tau(a, b) \cdot \tau(c, d) = \tau(ac, bd). \quad (4)$$

TEOREM. Sa (3) i (4) definirane su funkcije sa $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ u \mathbb{Q} . Funkcija $+$ definirana s (3) zove se zbrajanje, a funkcija \cdot definirana s (4) zove se množenje na \mathbb{Q} .

TEOREM. Zbrajanje i množenje su komutativne i asocijativne operacije na \mathbb{Q} . Također je zbrajanje distributivno prema množenju na \mathbb{Q} .

TEOREM. Za svaki element $\tau(a, b)$ skupa \mathbb{Q} vrijedi

$$\tau(a, b) + \tau(0, 1) = \tau(0, 1) + \tau(a, b) = \tau(a, b),$$

$$\tau(a, b) \tau(1, 1) = \tau(1, 1) \tau(a, b) = \tau(a, b),$$

$$\tau(a, b) \tau(0, 1) = \tau(0, 1) \tau(a, b) = \tau(0, 1).$$

Štoviše, $\tau(0, 1)$ i $\tau(1, 1)$ su jedinstveni elementi skupa \mathbb{Q} s ovim svojstvima.

Zbog prethodnog teorema ima, dakle, smisla označiti

$$\tau(0, 1) \equiv 0, \quad \tau(1, 1) \equiv 1.$$

TEOREM. Za svaki element $\tau(a, b)$ skupa \mathbb{Q} postoji jedinstveni element x skupa \mathbb{Q} takav da vrijedi

$$\tau(a, b) + x = x + \tau(a, b) = \tau(0, 1).$$

Nadalje, za svaki element $\tau(a, b)$ skupa $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ postoji jedinstveni element $y \in \mathbb{Q}^*$ takav da vrijedi

$$\tau(a, b) \cdot y = y \cdot \tau(a, b) = \tau(1, 1).$$

NAPOMENA. Za svaki $\tau(a, b) \in \mathbb{Q}$ označavat ćemo $\tau(-a, b) = -\tau(a, b)$ (inverzni element za zbrajanje na \mathbb{Q}), a za svaki $\tau(a, b) \in \mathbb{Q}^*$ označavat ćemo $\tau(b, a) = \tau(a, b)^{-1}$ (inverzni element za množenje na \mathbb{Q}). Pojam inverznog elementa s obzirom na množenje racionalnih brojeva je nešto novo u odnosu na ono što smo do sada imali. Upravo u tomu treba tražiti smisao uvođenja racionalnih brojeva.

22.3 Ulaganje cijelih u racionalne brojeve

Lako se pokaže da je funkcija $j : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ definirana s

$$j(m) = \tau(m, 1)$$

za svaki $m \in \mathbb{Z}$ dobro definirana i da je injekcija. Štoviše, ona ima svojstva da je za sve $m, m' \in \mathbb{Z}$ ispunjeno

$$j(m + m') = \tau(m + m', 1) = \tau(m, 1) + \tau(m', 1) = j(m) + j(m'),$$

$$j(mm') = \tau(mm', 1) = \tau(m, 1)\tau(m', 1) = j(m)j(m'),$$

te

$$j(1) = \tau(1, 1) = 1_Q.$$

Ove činjenice nam omogućavaju da poistovijetimo cijeli broj m s racionalnim brojem $j(m) = \tau(m, 1)$, odnosno da uložimo slup cijelih brojeva u skup racionalnih brojeva. Kako je za $n \neq 0$ ispunjeno

$$\tau(m, n) \tau(n, 1) = \tau(mn, n) = \tau(m, 1),$$

to je racionalni broj $\tau(m, n)$ rješenje jednadžbe

$$xj(n) = j(m),$$

pa je

$$x = \tau(m, n) \equiv \frac{j(m)}{j(n)} \equiv \frac{m}{n}.$$

Ovim je dan prikaz racionalnog broja kao kvocijenta dvaju cijelih brojeva, pri čemu je nazivnik n različit od nule.

Sada kada smo sve ovo dokazali možemo uvesti oznake na koje smo navikli: za $\tau(a, b) \in \mathbb{Q}$ ćemo pisati $\frac{a}{b}$. Uočimo da vrijedi

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = cb,$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Također je

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} \quad \text{i} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}, \quad a \neq 0.$$

TEOREM. Skup \mathbb{Q} je prebrojiv.

22.4 O uređenosti skupa \mathbb{Q}

Uređajnu relaciju na \mathbb{Q} uvodimo na osnovi sljedećeg teorema.

TEOREM. $\mathcal{P} = \{\mathbb{Q}_-, \mathbb{Q}_0, \mathbb{Q}_+\}$ je particija skupa \mathbb{Q} , pri čemu je

$$\mathbb{Q}_- = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : ab < 0 \right\}, \quad \mathbb{Q}_0 = \{0\}, \quad \mathbb{Q}_+ = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : ab > 0 \right\}.$$

Elemente skupa \mathbb{Q}_+ nazivamo *strogo pozitivnim* racionalnim brojevima, a elemente skupa \mathbb{Q}_- *strogo negativnim* racionalnim brojevima.

TEOREM. Skup

$$\rho = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y - x \in \mathbb{Q}_+\}$$

je stroga uređajna relacija na \mathbb{Q} .

Ova relacija uređaja na \mathbb{Q} ima mnoga lijepa svojstva. Tako vrijedi

$$(\forall m \in \mathbb{Z}) (\forall n \in \mathbb{Z}) (m < n \longrightarrow j(m) < j(n)) ,$$

pa preslikavanje j čuva uređaj na \mathbb{Z} . Također vrijedi i sljedeće.

TEOREM. Zbrajanje i množenje na \mathbb{Q} su kompatibilne operacije s uređajem na \mathbb{Q} .
Točnije vrijedi:

1. $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) (x < y \longrightarrow x + z < y + z)$;
2. $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) ((x < y \wedge 0 < z) \longrightarrow xz < yz)$.

Sada ćemo ukazati na još jedno važno svojstvo skupa \mathbb{Q} koje nemaju ni skup \mathbb{N} ni skup \mathbb{Z} .

DEFINICIJA. Za uređeni skup $(S, <)$ kažemo da je **gust** ako između svaka dva elementa skupa S postoji treći element skupa S , tj. ako vrijedi

$$(\forall a \in S) (\forall b \in S) (a < b \longrightarrow (\exists c \in S) (a < c < b)).$$

TEOREM. Skup \mathbb{Q} je **gust**.

23 Skup realnih brojeva

Vidjeli smo da elemente skupa \mathbb{Q} možemo zbrajati i množiti, te oduzimati i dijeliti (izuzev s nulom). Pri tome zbrajanje i množenje na \mathbb{Q} imaju ova svojstva:

- A1 $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) x + (y + z) = (x + y) + z$ (asocijativnost zbrajanja);
- A2 $(\exists 0 \in \mathbb{Q}) (\forall x \in \mathbb{Q}) 0 + x = x + 0 = x$ (neutralni el. za zbrajanje);
- A3 $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\exists -x \in \mathbb{Q}) x + (-x) = (-x) + x = 0$ (inverzni el. za zbrajanje);
- A4 $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) x + y = y + x$ (komutativnost zbrajanja);
- A5 $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (asocijativnost množenja);
- A6 $(\exists 1 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}) (\forall x \in \mathbb{Q}) 1 \cdot x = x \cdot 1 = x$ (neutralni el. za množenje);
- A7 $(\forall x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}) (\exists x^{-1} \in \mathbb{Q}) x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$ (inverzni el. za množenje);
- A8 $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) x \cdot y = y \cdot x$ (komutativnost množenja);
- A9 $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (distributivnost množenja prema zbrajanju).

Svaki skup P koji ima barem dva različita elementa i na kojem su definirane algebarske operacije zbrajanje i množenje s navedenih devet svojstava zove se *polje*.

Dakle je skup racionalnih brojeva \mathbb{Q} polje uz standardne operacije zbrajanja i množenja. No na skupu \mathbb{Q} osim navedene strukture polja postoji i uređajna struktura. Pokazali smo da je skup \mathbb{Q} uređen i pri tome taj uređaj ima ova svojstva:

Aa $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) (x < y \wedge y < z \longrightarrow x < z)$ (tranzitivnost rel. $<$);

Ab $(\forall x \in \mathbb{Q}) (x \not< x)$ (irefleksivnost re. $<$);

Ac $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (x \neq y \longrightarrow x < y \vee y < x)$ (linearost rel. $<$);

Ad $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (\forall z \in \mathbb{Q}) (x < y \longrightarrow x + z < y + z)$;

Ae $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (0 < x \wedge 0 < y \longrightarrow 0 < xy)$.

Kratko kažemo da je \mathbb{Q} uređeno polje. Štoviše, kako u skupu \mathbb{Q} vrijedi i

Af $(\forall x \in \mathbb{Q}) (\forall y \in \mathbb{Q}) (0 < x \wedge 0 \leq y \longrightarrow (\exists n \in \mathbb{N}) y \leq nx)$,

to \mathbb{Q} nazivamo *Arhimedovim poljem*.

Općenito, svako polje P koje je uređen skup i u kome vrijede svojstva $d)$ i $e)$ nazivamo *uređenim poljem*.

Ova svojstva racionalnih brojeva i želja da svaki odozgo omeđen rastući niz elemenata iz \mathbb{Q} ima i supremum u \mathbb{Q} vodi na definiciju *skupa realnih brojeva*.

DEFINICIJA. Neka je A podskup uređena skupa S . Kažemo da je skup A omeđen (ograničen) odozgo ako postoji barem jedan element g skupa S (zvan majoranta) takav da je za svaki element x skupa A ispunjeno $x \leq g$.

Kažemo da je skup A omeđen odozdo ako postoji barem jedan element d skupa S (zvan minoranta) takav da je za svaki element x skupa A ispunjeno $d \leq x$.

Kažemo da je A omeđen skup ako postoji elementi d, g skupa S takvi da je za svaki element x slupa A ispunjeno $d \leq x \leq g$.

Negacijom ovih pojmove dobivamo pojmove *neomeđenih skupova*.

DEFINICIJA. Neka su S_1 i S_2 dva uređena skupa. Za funkciju $f : S_1 \rightarrow S_2$ kažemo da je rastuća ako

$$(\forall x \in S_1) (\forall x' \in S_1) (x < x' \longrightarrow f(x) \leq f(x')) ,$$

a da je strogo rastuća ako

$$(\forall x \in S_1) (\forall x' \in S_1) (x < x' \longrightarrow f(x) < f(x')) .$$

Za funkciju $f : S_1 \rightarrow S_2$ kažemo da je padajuća ako

$$(\forall x \in S_1) (\forall x' \in S_1) (x < x' \longrightarrow f(x) \geq f(x')) ,$$

a da je strogo padajuća ako

$$(\forall x \in S_1) (\forall x' \in S_1) (x < x' \longrightarrow f(x) > f(x')) .$$

DEFINICIJA. Neka su S_1 i S_2 dva uređena skupa. Za funkciju $f : S_1 \rightarrow S_2$ kažemo da je monotona ako je rastuća ili padajuća, odnosno da je strogo monotona ako je strogo rastuća ili strogo padajuća.

Posebno, ako je S_1 skup prirodnih brojeva \mathbb{N} onda umjesto o monotonim funkcijama ovorimo o *monotonim nizovima* elemenata skupa S_2 .

Sada možemo dati definiciju skupa realnih brojeva.

DEFINICIJA. Skup \mathbb{R} zove se skup realnih brojeva, a njegovi elementi realni brojevi, ako \mathbb{R} ima sljedeća dva svojstva:

- a) \mathbb{R} je uređeno polje;
- b) svaki rastući niz elemenata skupa \mathbb{R} koji je odozgo omeđen ima u \mathbb{R} supremum.

Pri tome pod supremumom niza $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ podrazumijevamo supremum skupa $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Naravno, posebno se u matematici dokazuje da postoji ovakav skup. Sam dokaz se provodi pomoću tzv. *Dedekindovih rezova*, no mi to ovdje preskačemo.

TEOREM. Neka su $x, y, z, x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ realni brojevi. Tada vrijedi:

1. $(\forall i \in \{1, \dots, n\}) (x_i \leq y_i) \longrightarrow x_1 + \dots + x_n \leq y_1 + \dots + y_n;$
2. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (x \leq y \longleftrightarrow (\exists z \in \mathbb{R}) x + z \leq y + z);$
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) (2x = x \longrightarrow x = 0);$
4. $(\forall x \in \mathbb{R}) 0 \cdot x = 0;$
5. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) x(-y) = (-x)y = -(xy);$
6. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (\forall z \in \mathbb{R}) (x \leq y \wedge 0 \leq z \longrightarrow xz \leq yz);$
7. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (x \leq 0 \wedge 0 \leq y \longrightarrow xy \leq 0);$
8. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (x \leq 0 \wedge y \leq 0 \longrightarrow 0 \leq xy);$
9. $(\forall x \in \mathbb{R}) (x \neq 0 \longrightarrow x^2 > 0);$
10. $(\forall x \in \mathbb{R}) (x > 0 \longrightarrow x^{-1} > 0);$
11. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (0 < x < y \longleftrightarrow 0 < y^{-1} < x^{-1}).$

24 Apsolutna vrijednost

DEFINICIJA. Skup $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} = \langle 0, +\infty \rangle$ zove se skup pozitivnih realnih brojeva, a njegove elemente nazivamo pozitivnim realnim brojevima. Skup $\mathbb{R}_+ \cup \{0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} = [0, +\infty)$ zove se skup svih nenegativnih realnih brojeva.

Skup $\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\} = \langle -\infty, 0 \rangle$ zove se skup negativnih realnih brojeva, a njegove elemente nazivamo negativnim realnim brojevima.

NAPOMENA. Očigledno je

$$\begin{aligned}\mathbb{R} &= \mathbb{R}_- \cup \{0\} \cup \mathbb{R}_+, \\ \mathbb{R}_- \cap \mathbb{R}_+ &= \mathbb{R}_- \cap \{0\} = \mathbb{R}_+ \cap \{0\} = \emptyset,\end{aligned}$$

pa je $\{\mathbb{R}_-, \{0\}, \mathbb{R}_+\}$ jedna particija skupa \mathbb{R} .

Također

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (x \in \mathbb{R}_- \wedge y \in \mathbb{R}_+ \longrightarrow x < y).$$

DEFINICIJA. Funkcija $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ zove se **apsolutna vrijednost (modul)** ako je

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}.$$

Dakle je za bilo koji $x \in \mathbb{R}$ ispunjeno $|x| = \max \{-x, x\}$. Broj $|x|$ nazivamo **apsolutnom vrijednošću broja x** . Npr. $|7| = 7$, $|0| = 0$ i $|-3| = 3$.

TEOREM. Vrijedi:

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall a \in \mathbb{R}_+) (-a \leq x \leq a \longleftrightarrow |x| \leq a)$;
2. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) |x + y| \leq |x| + |y|$, s tim da će vrijediti jednakost u slučaju $x, y \neq 0$ ako i samo ako je za neki $t > 0$ ispunjeno $x = ty$;
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) ||x| - |y|| \leq |x - y|$;
4. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) |xy| = |x| \cdot |y|$.

TEOREM. Funkcija $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana za sve $x, y \in \mathbb{R}$ izrazom

$$d(x, y) = |x - y|$$

ima svojstva:

1. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) d(x, y) \geq 0;$
2. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (d(x, y) = 0 \longleftrightarrow x = y);$
3. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) d(x, y) = d(y, x);$
4. $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (\forall z \in \mathbb{R}) d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$

DEFINICIJA. Funkcija d zove se razdaljinska funkcija, a broj $d(x, y) = |x - y|$ zove se udaljenost realnih brojeva x i y .

24.1 Cijeli i racionalni brojevi u skupu realnih brojeva

Neka je \mathbb{R} skup realnih brojeva i 1 neutralni element za množenje u polju \mathbb{R} (odnosno jedinica). Po jednom od teorema iz $1 \neq 0$ slijedi $1^2 = 1 > 0$. No tada je i $1 + 1 = 2 \cdot 1 > 0$ i analogno $n \cdot 1 > 0$ za svaki prirodan broj n .

Neka je funkcija $j : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ za svaki prirodan broj n definirana izrazom

$$j(n) = n \cdot 1.$$

Označimo

$$\mathbb{N}' = j(\mathbb{N}) \subset \mathbb{R}.$$

Funkcija j ima svojstva:

1. $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) j(m+n) = j(m) + j(n);$
2. $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) j(m \cdot n) = j(m) \cdot j(n);$
3. $(\forall m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) (m \leq n \longrightarrow j(m) \leq j(n)).$

Ovo pokazuje da je na \mathbb{N}' definirano zbrajanje, množenje i uređaj u skladu sa zbrajanjem, množenjem i uređajem na skupu prirodnih brojeva \mathbb{N} .

U stvari, lako je dokazati da skup \mathbb{N}' zajedno s funkcijom $s : \mathbb{N}' \rightarrow \mathbb{N}'$ definiranom sa

$$s(n \cdot 1) = (n + 1) \cdot 1$$

zadovoljava sve aksiome skupa prirodnih brojeva. Elementi skupa \mathbb{N}' zovu se *prirodni realni brojevi*, ili jednostavno prirodni brojevi. U dalnjemu ćemo umjesto \mathbb{N}' pisati \mathbb{N} (dakle shvaćamo \mathbb{N} kao podskup skupa \mathbb{R}), a umjesto $n \cdot 1$ jednostavno n .

Slično, s $-n$ ćemo označavati broj $n \cdot (-1)$. Skup

$$\mathbb{Z}' = \{0, n \cdot 1, n \cdot (-1) : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$$

zove se skup *cijelih realnih brojeva*, ili jednostavno skup cijelih brojeva, a njegove elemente nazivamo *cijelim realnim brojevima*, ili jednostavno cijelim brojevima. I opet ćemo pisati jednostavno \mathbb{Z} umjesto \mathbb{Z}' i $-n$ umjesto $n \cdot (-1)$.

Kada smo u skupu \mathbb{R} pronašli analogone prirodnih i cijelih brojeva, lako napravimo isto i za racionalne brojeve. Naime, za svaki element $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ postoji inverzni (*recipročni*) element $a^{-1} \in \mathbb{R}$ kojeg ćemo označiti s

$$a^{-1} = \frac{1}{a}.$$

Sada za $n \in \mathbb{N}$ i $m \in \mathbb{Z}$ realni broj $mn^{-1} \in \mathbb{R}$ označimo kao

$$mn^{-1} = \frac{m}{n}$$

i zovemo *racionalni realni broj* ili jednostavno *racionalni broj*. Skup

$$\mathbb{Q}' = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N} \wedge m \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}$$

zovemo skupom *racionalnih realnih brojeva* i jednostavno ga označavimo s \mathbb{Q} .

TEOREM. Skup realnih brojeva \mathbb{R} je Arhimedovo polje.

TEOREM. Između bilo koja dva različita realna broja postoji barem jedan racionalni broj.

TEOREM. (G. Cantor, 1874.) Skup $\Delta_0 = [a, b]$, $a < b$, svih realnih brojeva između brojeva a i b je neprebrojiv.

KOROLAR. Skup \mathbb{R} je neprebrojiv.

Vidjeli smo da se kardinalni broj skupa \mathbb{N} označava s \aleph_0 . Kardinalni broj skupa \mathbb{R} označava se s c (čitamo *continuum*) a po prethodnom je $\aleph_0 \neq c$.

KOROLAR. Postoji barem jedan rastući, odozgo omeđen niz racionalnih brojeva koji u skupu racionalnih brojeva nema supremum.

DEFINICIJA. Realni broj koji nije racionalan zove se iracionalan broj.

KOROLAR. Skup svih iracionalnih brojeva je neprebrojiv.

24.2 Binomni teorem

Neka je $n \in \mathbb{N}$. Označit ćemo

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n.$$

Posebno se uzima da je $0! = 1$.

Očito je za svaki prirodan broj n ispunjeno

$$(n+1)! = (n+1) n!.$$

Dalje ćemo za $n \in \mathbb{N}$ i $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ označiti

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Broj $\binom{n}{k}$ nazivamo *binomnim koeficijentom*, a zašto vidjet ćemo u narednom teoremu.

Lako se pokaže da vrijedi:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k},$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1,$$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

TEOREM. Za bilo koji $n \in \mathbb{N}$ i za sve $a, b \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

PRIMJER. Vrijedi:

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$
2. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3;$
3. $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$

Dakle, binomni koeficijenti su dobili svoje ime zahvaljujući činjenici da se pojavljuju kao koeficijenti prilikom razvoja binoma. Oni se mogu poredati u tzv. *Pascalov trokut*.

NAPOMENA. Binomni je teorem važan kod dokazivanja egzistencije supremuma niza $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definiranog izrazom

$$a(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}.$$

Pomoću binomnog teorema se pokaže da je za sve $n \in \mathbb{N}$ ispunjeno

$$2 < a_n < 3,$$

a kako je ovaj niz realnih brojeva očigledno rastući, to on u skupu \mathbb{R} ima supremum. Označimo

$$\begin{aligned} e &= \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \\ &= \sup \left\{ \left(2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) : n \in \mathbb{N} \right\} \\ &= 2,718281828459045 \dots . \end{aligned}$$

Iracionalni broj e zovemo bazom prirodnih ili Neperovih logaritama.

25 Skup kompleksnih brojeva

Slično kao što smo skupove cijelih i racionalnih brojeva izgradili pomoću prirodnih, tako ćemo sada i skup kompleksnih brojeva izgraditi pomoću skupa realnih brojeva. Osnova za to nam je sljedeći teorem.

TEOREM. Skup $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ je polje u odnosu na operacije zbrajanja i množenja definirane za sve $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{R}^2$ sa:

1. $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$;
2. $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$.

Polje $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, u oznaci \mathbb{C} , nazivamo *poljem kompleksnih brojeva*, a njegove elemente nazivamo *kompleksnim brojevima*. Kompleksne brojeve najčešće označavamo slovima z, w, \dots

Uočimo da skup

$$\mathbb{R}' = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$$

ima svojstva skupa realnih brojeva. Naime, preslikavanje $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}'$ definirano za sve $a \in \mathbb{R}$ sa

$$j(a) = (a, 0)$$

ima svojstvo da je za sve $a, b \in \mathbb{R}$ ispunjeno

1. $j(a + b) = (a + b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = j(a) + j(b);$
2. $j(ab) = (ab, 0) = (a, 0)(b, 0) = j(a)j(b);$

pa se operacije zbrajanja i množenja na \mathbb{R} prenose na \mathbb{R}' . Također se lako vidi da je j bijekcija. Zbog svega ovoga smijemo poistovijetiti skupove \mathbb{R} i \mathbb{R}' i za $a \in \mathbb{R}$ pisati

$$(a, 0) \equiv a,$$

pa skup \mathbb{R}' nazivamo skupom *realnih kompleksnih brojeva*.

No upravo nam ova činjenica omogućava da dođemo do dobro poznatog *standardnog zapisa kompleksnog broja*. Naime, za svaki $z = (a, b) \in \mathbb{R}$ vrijedi:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) \equiv a + b(0, 1).$$

Uvedemo li oznaku

$$i \equiv (0, 1)$$

dobijemo

$$z = a + bi = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)i.$$

Realni broj $\operatorname{Re}(z)$ nazivamo *realnim dijelom* kompleksnog broja z , realni broj $\operatorname{Im}(z)$ nazivamo *imaginarnim dijelom* kompleksnog broja z , a i nazivamo *imaginarnom jedinicom*. Uočimo da sam i nije dio imaginarnog dijela broja z .

Stavimo li da je $i^0 \equiv 1$, lako se provjeri da vrijedi

$$i^0 = 1, i^1 = 1, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1.$$

Stoga je za svaki cijeli broj k ispunjeno

$$i^k = i^n, \quad k \equiv n \pmod{4}, \quad n \in \{0, 1, 2, 3\}$$

pa se vrlo lako mogu računati potencije imaginarnе jedinice ako im je eksponent cijeli broj. Npr.

$$i^{243} = i^3 = -i, \quad i^{-563} = i^1 = i.$$

Postavlja se pitanje: da li je uz neku operaciju uređaja skup \mathbb{C} uređeno polje? Naredni teorem to opovrgava.

TEOREM. Na skupu \mathbb{C} ne postoji relacija uređaja $<$ takva da je \mathbb{C} uređeno polje.

Ovaj teorem nam ukazuje na to da je struktura skupa \mathbb{C} bitno različita od strukture skupa \mathbb{R} , iako je sam skup \mathbb{C} izgrađen pomoću skupa \mathbb{R} .

DEFINICIJA. Neka je $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Tada broj

$$\bar{z} = a - bi \in \mathbb{C}$$

nazivamo konjugirano kompleksnim brojem broja z .

Sada možemo definirati preslikavanje $\text{conj} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ sa

$$z \mapsto \bar{z}.$$

Lako se provjeri da za sve $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ vrijedi:

1. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$;
2. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$;
3. $\overline{\overline{z_1}} = z_1$.

Također je za sve $z = a + bi \in \mathbb{C}$ ispunjeno

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R},$$

pa je izrazom

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2},$$

dobro definirano preslikavanje "apsolutna vrijednost" $|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$. Broj $r(z) = |z|$ nazivamo *radiusom kompleksnog broja* z .

Kompleksne brojeve prikazujemo u tzv. Gaussovoj ravnini. Koristeći absolutnu vrijednost kompleksnog broja možemo definirati i udaljenost među kompleksnim brojevima. Razdaljinsku funkciju $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ za sve $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ definiramo izrazom:

$$d(z_1, z_2) = |z_2 - z_1|,$$

i ona ima ista svojstva kao i kod realnih brojeva.

25.1 Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

Podsjetimo se da smo u svakom novom skupu brojeva mogli uvesti neku novu operaciju. Tako smo u skupu \mathbb{Z} mogli oduzimati (tj. dobili smo inverzne elemente u odnosu na zbrajanje), u skupu \mathbb{Q} smo mogli dijeliti (tj. dobili smo inverzne elemente u odnosu na množenje), a u skupu \mathbb{R} smo mogli računati potencije pozitivnih brojeva i kada je eksponent racionalan broj, tj. mogli smo vaditi korjene iz pozitivnih brojeva). U skupu \mathbb{C} je pak moguće vaditi korjene iz svih kompleksnih brojeva. Također, u skupu \mathbb{R} je za $n \in \mathbb{N}$ i $a \in \mathbb{R}$ jednadžba $x^n = a$ imala najviše dva rješenja (ovisno o predznaku broja a i parnosti broja n), no u skupu \mathbb{C} ona će uvijek imati točno n rješenja.

Da bismo na jednostavan način vadili korjene iz kompleksnih brojeva uvest ćemo novi način zapisivanja kompleksnih brojeva.

Nacrtamo li broj $z = a + bi \in \mathbb{C}$ u Gaussovoj ravnini lako se vidi da vrijedi

$$b = r \sin \varphi, \quad a = r \cos \varphi,$$

gdje je $r = r(z)$, a $\varphi = \arg(z) \in [0, 2\pi)$ kut koji spojnica ishodišta $(0, 0)$ i točke (a, b) zatvara s pozitivnim dijelom realne osi. Taj kut nazivamo *argumentom* kompleksnog broja.

Sada smo dobili

$$z = a + bi = r (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

i ovakav zapis nazivamo *trigonometrijskim oblikom* kompleksnog broja.

Sada se za bilo koje $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1), z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \in \mathbb{C}$ aritmetičke operacije provode u skladu sa sljedećim formulama:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)), \\ z_1^n &= r_1^n (\cos n\varphi_1 + i \sin n\varphi_1), \\ \sqrt[n]{z_1} &= \sqrt[n]{r_1} \left(\cos \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Uočimo da u ovakvom zapisu nije lako zbrajati kompleksne brojeve.

PRIMJER. Neka je $z = i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$. Tada je npr.

$$z^3 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = 0 + i(-1) = -i.$$

Također je npr.

$$\begin{aligned}\sqrt{z} &= \cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2} \\ &= \cos \frac{(1+4k)\pi}{4} + i \sin \frac{(1+4k)\pi}{4}, \quad k = 0, 1,\end{aligned}$$

pa su rješenja $w_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ i $w_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$.

Napomenimo još da n -ti korjeni iz nekog kompleksnog broja z leže u vrhovima pravilnog n -terokuta upisanog središnjoj kružnici radiusa $\sqrt[n]{r(z)}$, pri čemu je kut među susjednim vrhovima upravo $\arg(z)/n$.

26 Polinomi

Ako je S proizvoljan neprazan skup i $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, onda kažemo da je f *realna funkcija*. Ako je još i $S \subset \mathbb{R}$, onda kažemo da je f *realna funkcija realne varijable*. U ovomu poglavlju bavit ćemo se samo realnim funkcijama realne varijable. Među najjednostavnije funkcije te vrste spadaju *polinomi*.

DEFINICIJA. Neka je $n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ i neka su a_0, \dots, a_n realni brojevi. Funkcija $p_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definirana izrazom

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

za sve $x \in \mathbb{R}$ zove se polinom. Brojevi a_0, \dots, a_n zovu se koeficijenti polinoma p_n . Ako je $a_n \neq 0$, onda kažemo da je polinom p_n stupnja n i pišemo $\partial p_n = n$, a broj a_n nazivamo vodećim koeficijentom polinoma p_n . Posebno, ako je $a_n = 1$ kažemo da je polinom p_n normiran.

Polinom o za koga vrijedi

$$(\forall x \in \mathbb{R}) o(x) = 0$$

zovemo *nul-polinom* i on je jedini polinom nedefiniranoga stupnja.

Polinom nultoga stupnja je za sve $x \in \mathbb{R}$ definiran izrazom

$$p_0(x) = a_0, \quad a_0 \neq 0.$$

Polinom prvoga stupnja je za sve $x \in \mathbb{R}$ definiran izrazom

$$p_1(x) = a_0 + a_1x, \quad a_1 \neq 0,$$

a polinom drugoga stupnja izrazom

$$p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, \quad a_2 \neq 0.$$

Općenito s \mathcal{P}_n označavamo skup svih polinoma stupnja manjega ili jednakoga n uključujući i nul-polinom, a s \mathcal{P} skup svih polinoma definiranih nad \mathbb{R} . Dakle, vrijedi

$$\mathcal{P} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} \mathcal{P}_n.$$

TEOREM. Za polinom p_n vrijedi $p_n = o$ ako i samo ako je

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

KOROLAR. Dva polinoma

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0,$$

i

$$q_m(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m, \quad b_m \neq 0$$

su jednaka ako i samo ako je $n = m$ i

$$(\forall i \in \{1, \dots, n\}) a_i = b_i.$$

DEFINICIJA. Zbroj dviju funkcija $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcija $f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takva za sve $x \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

Lako se vidi da je zbrajanje funkcija asocijativno i komutativno, jer je takvo zbrajanje realnih brojeva.

Još ćemo uvesti i sljedeću oznaku: za funkciju $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s $-f$ ćemo označiti funkciju $-f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takvu da za sve $x \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$(-f)(x) = -f(x).$$

NAPOMENA. Uočimo da za svaku funkciju $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vrijedi

$$f + o = o + f = f,$$

pa je nul-polinom o neutralni element za zbrajanje funkcija. To posebno znači i to da je o neutralni element za zbrajanje polinoma.

Također, za svaku funkciju $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vrijedi

$$f + (-f) = (-f) + f = o,$$

pa svaka funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ima inverzni element s obzirom na zbrajanje funkcija.

Još ćemo posebno istaknuti tzv, *jedinični* polinom, tj. polinom $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stupnja nula definiran za sve $x \in \mathbb{R}$ izrazom $j(x) = 1$. On će nam biti važan kada u sljedećem teoremu uvedemo množenje među funkcijama.

DEFINICIJA. Umnožak dviju funkcija $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcija $fg : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takva za sve $x \in \mathbb{R}$ vrijedi

$$(fg)(x) = f(x)g(x).$$

Lako se vidi da je množenje funkcija asocijativno i komutativno, jer je takvo množenje realnih brojeva.

NAPOMENA. Uočimo da za svaku funkciju $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vrijedi

$$fj = jf = f,$$

pa je jedinični polinom neutralni element za množenje funkcija. To posebno znači i to da je j neutralni element za množenje polinoma.

Posebno, pomnožimo li dva polinoma p_n i q_m stupnja n odnosno m , rezultat će biti opet polinom stupnja $n + m$.

TEOREM. Neka je p_m polinom stupnja m . Za svaki polinom P_n stupnja n postoji jedinstveni uređeni par polinoma (q, r) takav da je

$$P_n = qp_m + r,$$

pri čemu je $\partial r < m$ kad god je $r \neq o$, a $\partial q = n - m$ kad god je $n \geq m$.

DEFINICIJA. Neka su sve oznake kao u prethodnom teoremu. Polinom q zovemo kvocijentom, a polinom p_m djeliteljem ili divizorom. Ako je $r = o$ kažemo da je polinom P_n djeljiv s polinomom p_m ili da je p_m njegova mjera. Ako je $r \neq o$ zovemo ga ostatkom pri djeljenju polinoma P_n polinomom p_m .

DEFINICIJA. Normirani polinom $m(p, q)$ zove se najveća zajednička mjera polinoma $p, q \neq o$ ako on ima ova dva svojstva:

- a) $m(p, q)$ je mjera polinoma p i q ;
- b) ako r dijeli i p i q , onda r dijeli i $m(p, q)$.

Egzistencija i stvarni postupak za nalaženje takve najveće zajedničke mjere dvaju nenul polinoma dobiva se iz tzv. Euklidova algoritma za polinome koji je analogan onomu za prirodne brojeve.

TEOREM. Za svaka dva polinoma $p, q \neq o$ postoji najveća zajednička mjera $m(p, q)$ i ona je jedinstvena. Pored toga postoje polinomi a i b takvi da je

$$ap + bq = m(p, q)$$

i

$$\partial a < \partial q, \quad \partial b < \partial p.$$

DEFINICIJA. Kažemo da su polinomi $p, q \neq o$ relativno prosti ako je $m(p, q) = j$.

DEFINICIJA. Kažemo da je polinom p ireducibilan nad poljem \mathbb{R} ako $p = qr$ povlači $\partial q = 0$ ili $\partial r = 0$.

Korištenjem prethodnog teorema lako se pokaže da vrijede sljedeće tvrdnje:

1. Ako je p relativno prost s q i r , onda je relativno prost i s qr ;
2. Ako je q djelitelj umnoška pr , te p i q relativno prosti, onda q dijeli r ;
3. Ako su relativno prosti polinomi q i r djelitelji polinoma p , onda je i qr djelitelj polinoma p ;
4. Svaki polinom p je umnožak ireducibilnih polinoma;
5. Faktorizacija na ireducibilne polinome je jedinstvena do na permutaciju.

Uočimo da nam Tvrđnja 4 ne kaže kojega su stupnja ti ireducibilni faktori. No sada ćemo bez dokaza dati teorem koji nam kazuje da se nad poljem \mathbb{C} (za razliku od polja \mathbb{R}) svaki polinom može prikazati kao umnožak ireducibilnih faktora stupnja jedan.

TEOREM. Neka je p polinom n -tog stupnja nad poljem \mathbb{C} , $n \in \mathbb{N}$. Tada postoji barem jedna kompleksni broj z_0 takav da je $p(z_0) = 0$. Štoviše, postoje kompleksni brojevi z_1, \dots, z_n takvi da je

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n).$$

PRIMJER. Npr. polinom p definiran s $p(x) = 1 + x^2$ ireducibilan nad \mathbb{R} i nema nijednu nul-točku. S druge strane je

$$p(x) = (x - i)(x + i),$$

pa ovaj polinom nad \mathbb{C} ima dvije nul-točke i reducibilan je.

27 Racionalne funkcije

DEFINICIJA. Funkcija $Q : S \rightarrow \mathbb{R}$ koja je za sve $x \in S$ definirana izrazom

$$Q(x) = \frac{p_n(x)}{q_m(x)},$$

pri čemu je

$$S = \{x \in \mathbb{R} : q_m(x) \neq 0\}, \quad p_n, q_m \in \mathcal{P} \text{ i } q_m \neq 0,$$

zove se racionalna funkcija. Racionalna funkcija $Q \neq 0$ je u kanonskom obliku ako je $m(p_n, q_m) = j$. Racionalna funkcija Q je prava racionalna funkcija ako je $n < m$.

Podsjetimo se da se može pisati

$$p_n = qq_m + r,$$

pa je

$$Q = \frac{p_n}{q_m} = q + \frac{r}{q_m},$$

pri čemu je r/q_m prava racionalna funkcija. Očito je ovaj prikaz jedinstven.

DEFINICIJA. Pravi razlomak r/q je prost (parcijalni razlomak) ako je $q = p^k$, pri čemu je polinom p ireducibilan nad \mathbb{R} i $\partial r < \partial p$.

TEOREM. Svaka prava racionalna funkcija $Q = p/q$, $p, q \neq 0$, može se na jedinstven način prikazati kao zbroj prostih razlomaka.